

ИНСТРУКЦИЯ


по применению препарата
Постеризан (Posterisan®)

Регистрационное удостоверение №

Лекарственная форма

Суппозитории ректальные.

Состав и форма выпуска



Действующие вещества: 1 суппозиторий содержит: 387,10 мг стандартизированной суспензии клеток бактерий *E. Coli*, что соответствует 660×10^6 *E. Coli*, инактивированных и законсервированных с 6,60 мг жидкого фенола (соотв. 6,0 мг чистого фенола).

Вспомогательные вещества: макрогол глицерилгидроксистеарат, жир твёрдый.

Описание

Однородные суппозитории от белого до светло-бежевого цвета с запахом фенола.

Фармакотерапевтическая группа.

СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

Код АТС C05AX.

Фармакологические свойства.**Фармакодинамика.**

Компоненты клеточной стенки бактерий, содержащиеся в стандартизированной бактериальной культуре *E.coli*, стимулируют



процессы местного иммунитета, ускоряя процессы заживления повреждений.

Фармакокинетика.

По данным иммуногистохимических доклинических исследований, компоненты бактериальной стенки E.coli способны проникать в слизистую оболочку кишечника.

Показания к применению

Местное лечение симптомов геморроя

Суппозитории назначают взрослым для лечения:

- перианального зуда
- жжения в области ануса при геморрое

Способ применения и дозы

Перед применением необходимо провести гигиенические процедуры анальной области.

Применять ректально, взрослым по 1 суппозиторию 2 раза в сутки (утром и вечером), по возможности после дефекации.

Продолжительность курса лечения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания.

Обычно срок применения составляет 5-7 дней.

Особенности применения (дозирования) у лиц с нарушением функции печени, почек, других категорий пациентов.

Не применимо.

Дети.

Не применять детям.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь



Побочное действие

Постеризан редко вызывает побочные явления даже при длительном применении. У пациентов с повышенной чувствительностью к консерванту фенолу или другим компонентам препарата возможны кожные аллергические реакции, при развитии которых применение препарата следует прекратить.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из компонентов препарата.

Применение при беременности и в период кормления грудью

Может без риска применяться во время беременности и в период кормления грудью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не выявлены.

Передозировка


Случаи передозировки или интоксикации, связанные с применением препарата Постеризан суппозитории, не выявлены. Поскольку дозирование активного вещества рассчитано на локальное воздействие на кожу или слизистую оболочку в анальной области, опасность передозировок при надлежащем терапевтическом применении не грозит.

При ошибочном приеме внутрь (дети) это может привести к расстройствам желудочно-кишечного тракта (боли в животе, тошнота).

Меры предосторожности

Лечение продолжать до исчезновения симптомов, но не более 5-7 дней.

При отсутствии эффекта необходимо пересмотреть проводимую терапию.



В случае грибковых инфекций необходимо одновременно применять местный противогрибковый препарат.

Форма выпуска

По 5 штук в блистере из алюминиевой фольги. По два блистера (10 суппозиториев) в картонной пачке с инструкцией по применению.

Условия хранения

В защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре от 0 °С до 25 °С.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке!

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.


Производитель

Др. Каде Фармацевтическая Фабрика ГмбХ,

Германия, 12277 Берлин, Ригиштрассе, 2

Тел. +49 30 7208 2 0

Факс +49 30 7208 2 200



СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь