


Инструкция
по применению препарата
Постеризан форте (Posterisan® forte)

Регистрационное удостоверение №



Лекарственная форма

Суппозитории ректальные.

Состав и форма выпуска

Действующие вещества: 1 суппозиторий содержит: 387,10 мг стандартизированной суспензии клеток бактерий *E. Coli*, что соответствует 1000×10^6 *E. Coli*, инактивированных и законсервированных с 6,60 мг жидкого фенола (соотв. 6,0 мг чистого фенола) и 5,00 мг гидрокортизона.

Вспомогательные вещества: ацетилцистеин, α -токоферол, динатрия эдетат, макрогол глицерилгидроксистеарат, жир твёрдый.

Описание

Однородные суппозитории от белого до светло-желтого цвета с запахом фенола.

Фармакотерапевтическая группа.


СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

Средства, содержащие кортикостероиды.

Код АТС C05AA.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.



Компоненты клеточной стенки бактерий, содержащиеся в стандартизированной бактериальной культуре *E.coli*, стимулируют процессы местного иммунитета, ускоряя процессы заживления повреждений.

Гидрокортизон ингибирует реакции воспаления, аллергии, уменьшает локальную болезненность и зуд.

Фармакокинетика.

По данным иммуногистохимических доклинических исследований, компоненты бактериальной стенки *E.coli* способны проникать в слизистую оболочку кишечника.

При местном нанесении гидрокортизон проникает во все слои слизистой оболочки, незначительное количество попадает в регионарный и системный кровоток. Применение гидрокортизона в составе суппозиториев ПОСТЕРИЗАН ФОРТЕ не приводит к значимому повышению концентрации гидрокортизона в системном кровотоке. При непродолжительном применении лекарственного средства в указанной дозировке ожидается отсутствие проявлений системного действия гидрокортизона.

Показания к применению.

Местное лечение симптомов геморроя.

Способ применения и дозы.

Перед применением необходимо провести гигиенические процедуры анальной области.



Применять ректально, взрослым по 1 суппозиторию 2 раза в сутки (утром и вечером), по возможности после дефекации.

Продолжительность курса лечения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания.

Обычно срок применения составляет 5-7 дней.

Дети.


Не применять детям.



Противопоказания.

Повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому из компонентов препарата.

Специфические инфекции в аноректальной области (туберкулез, сифилис, гонорея), ветряная оспа, реакция на вакцинацию, грибковые заболевания, воспалительные заболевания кожи лица (периоральный дерматит, розацеа), другие бактериальные, вирусные, паразитарные инфекции, язвенные поражения и атрофические изменения в области применения лекарственного средства, опухоли аноректальной зоны.

**Меры предосторожности.**

Лечение продолжать до исчезновения симптомов, но не более 5-7 дней.

При отсутствии эффекта необходимо пересмотреть проводимую терапию.

При применении любых глюкокортикостероидов следует помнить о возможности системной абсорбции.


В случае грибковых инфекций необходимо одновременно применять местный противогрибковый препарат.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

При одновременном применении суппозитория Постеризан форте с другими препаратами, содержащими кортикостероиды (в форме таблеток, капель или инъекций), возможно усиление терапевтических и побочных эффектов глюкокортикостероидов.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ**Беременность**


Отсутствуют соответствующие данные по применению медицинских препаратов беременными женщинами.



Таким образом, медицинские препараты необходимо применять во время беременности исключительно в тех случаях, когда это строго показано и после тщательной оценки соотношения польза-риск.

Лактация

Гидрокортизон выделяется в грудное молоко. В течение продолжительного периода и периода приема гидрокортизона или введения больших доз указанного вещества необходимо избегать кормления ребенка грудью.



Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Данные отсутствуют.

Побочные реакции.

В отдельных случаях у больных с повышенной чувствительностью к компонентам суппозиторий Постеризан форте могут наблюдаться реакции гиперчувствительности, включая зуд и жжение, депигментация, гипертрихоз, сухость кожи.

Может вызвать контактный дерматит (реакции, вызываемые фенолом).

При длительном использовании препарата в высоких дозах возможны следующие дерматологические реакции: дерматит, экзема, замедление заживления ран и трещин, развитие вторичной инфекции, атрофия слизистой оболочки, атрофия кожи, адренокортикальная супрессия, расширение капилляров (телеангиэктазия), появление растяжек на коже (стрий) и стероидных угрей.

Передозировка


О случаях передозировки или интоксикации не сообщалось. Передозировка вызывает угнетение функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. В случае случайного приема внутрь суппозиторий (например,



детьми) возможны проявления дисфункции желудочно-кишечного тракта (боли в животе, тошнота).

Длительное применение в больших дозах усиливает резорбцию и повышает риск развития системных эффектов гидрокортизона, таких как нарушения менструального цикла, повышение артериального давления, замедление заживления ран, мышечная слабость, бессонница, повышение уровня сахара в крови.

В случае, если наблюдаются симптомы гиперкортицизма, лечение следует прекратить.



Форма выпуска

Суппозитории по 5 штук в блистере из алюминиевой фольги, по 2 блистера (10 суппозиторияев) вместе с инструкцией по применению в пачке картонной.

Условия хранения

В защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре от 0 °С до 25 °С.

Срок годности

2 года

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Др. Каде Фармацевтическая Фабрика ГмбХ

Германия, 12277 Берлин, Ригиштрассе, 2

Тел. +49 30 7208 2 0

Факс +49 30 7208 2 200

