

18.10.2017

НД РБ

8622 - 2017

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
(информация для пациента)

ВЕРТИГОХЕЛЬ®
(VERTIGOHEEL®)

Торговое название препарата
Вертигохель®

Лекарственная форма
Капли для приема внутрь гомеопатические

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от «20» 11 20 14 г. № 1314
КЛС № 12 от «30» 10 20 14 г.

Описание:

Прозрачная бесцветная или слабо светло-желтая жидкость с запахом этанола и иногда со специфическим запахом кониума.

Состав (на 1 мл):

Активные компоненты:

Анамирта коккулюсовидная (Anamirta cocculus)	D4	0,7г
Болиголов пятнистый (Conium maculatum)	D3	0,1г
Амбра серая (Ambra grisea)	D6	0,1 г
Петролеум очищенный (Petroleum rectificatum)	D8	0,1г
Препарат содержит этанол около 35 % (объемных)		

Фармакотерапевтическая группа Прочие лекарственные средства

Фармакологические свойства Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав. Гомеопатический метод лечения существенно отличается от традиционной медицины. Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

Область применения

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических показаний. Применяется в комплексной терапии головокружений различного происхождения.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Беременность и период грудного вскармливания (в связи с недостаточностью клинических данных). Детский возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных. С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма и заболевания головного мозга.

Способ применения и дозы

Если врач не назначил иначе, принимают по 10 капель, растворив в 100 мл воды, 3 раза в день. Продолжительность лечения определяется врачом. В случае развития приступа

НД РБ
8622 - 2017

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАЩЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

головокружения препарат может назначаться по 10 капель ~~каждые полчаса, но не более~~ 12 раз в день. При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться к врачу. Не рекомендуется принимать гомеопатические препараты в течение длительного времени без консультации с врачом.

Побочное действие

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и сообщить об этом врачу

Возможны аллергические реакции. При обнаружении побочных эффектов, в том числе не описанных в инструкции, следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами. В случае применения других лекарственных средств, рекомендуется проконсультироваться с врачом

Применение при беременности и лактации

Лекарственное средство не следует применять в период беременности и лактации в связи с недостаточностью клинических данных.

Меры предосторожности

Если во время приема гомеопатического средства симптомы заболевания сохраняются, следует обратиться к врачу. Разовая доза взрослого содержит около 0,035г абсолютного спирта этилового, максимальная суточная доза- 0,28г этанола.

Следует соблюдать осторожность при использовании препарата у пациентов с заболеваниями печени, алкоголизмом, черепно-мозговой травмой, заболеваниями головного мозга.

В случае наличия стойких или необъяснимых симптомов необходимо обратиться к врачу, так как данные симптомы могут быть проявлением заболеваний, которые требуют медицинского обследования и лечения.

Влияние на способность управлять автотранспортом и другими механизмами:

В период лечения необходимо воздержаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими концентрации внимания и быстрой психомоторных реакций.

Форма выпуска


Капли для приема внутрь гомеопатические. По 30 мл во флаконы темного стекла гидролитического класса III со встроенной капельницей из полиэтилена и навинчивающейся крышечкой с контролем первого вскрытия из полипропилена. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Срок годности:

5 лет.

Не применять по истечении срока годности указанного на упаковке!

НД РБ
8622 - 2017



Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15°C до 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хель ГмбХ
Доктор-Рекевег-штрассе 2-4,
Д-76532 Баден-Баден, Германия

Организация, уполномоченная на принятие претензий в Республике Беларусь

УП Белнико
220123 г. Минск
Ул. В. Хоружей 22 оф. 1405
Тел. +375 17 283 17 38
E-mail direct@belnico.by
Сайт www.belnico.by