

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

информация для пациента лекарственного средства

ДОКТОР ТАЙС АНГИ СЕПТ

таблетки для рассасывания со вкусом лимона


Состав:

1 таблетка (2,5г)

активные ингредиенты

МГ

2,4-Дихлорбензиловый спирт	1,2
Ментол	5,4
Анетол	2,4
Масло мяты перечной	0,6

*неактивные ингредиенты*

сахароза, глюкозы сироп, лимонная кислота, ароматическая смесь лимонных масел, ароматизатор лиметт, ароматизатор красный апельсин, бета каротин 1%, вода

Описание.

Круглые плоскоцилиндрические таблетки с фаской и углубленными центрами желтого цвета с неравномерным окрашиванием и характерным запахом и вкусом. Возможно наличие включений пузырьков воздуха, незначительная неровность краев и легкое прилипание к первичной упаковке.

Фармакотерапевтическая группа:

Антисептическое средство.

Код ATX: R02AA20

Фармакологическое действие: Комбинированный противомикробный препарат для местного применения в полости рта и глотки. Обладает антисептическим действием. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Показания к применению:

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки (боль при глотании).

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Детский возраст до 6 лет.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 6 лет каждые 2-3 часа медленно рассасывать во рту 1 таблетку, но не более 6 таблеток в сутки. Продолжительность лечения не более 2-3 дней.

Побочные действия:

Возможны аллергические реакции кожи, дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.

Передозировка:

Маловероятна, возможная передозировка может привести к симптомам дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота). Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не выявлено.

Меры предосторожности

Препарат не рекомендуется принимать при кровоточащих ранах в полости рта и горла, но в случае приема таблетку следует рассасывать с осторожностью.

Непосредственно после приема препарата следует воздержаться от приема пищи и жидкости.

Если симптомы заболевания сохраняются более 3-х дней, врач должен уточнить диагноз и (при необходимости) скорректировать схему лечения.

Пациенты с редкими наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбией или сахаразной-изомальтазной недостаточностью не должны принимать Анги Септ.

1 таблетка содержит 953,0 мг глюкозы и 1428,0 мг сахарозы, что соответствует около 0,2 хлебных единиц (ХЕ). Это следует учитывать пациентам с сахарным диабетом.

Применение в период беременности и кормления грудью

Безопасность применения лекарственного средства во время беременности и кормления грудью не установлена, применение лекарственного средства возможно только по назначению врача после оценки соотношения пользы и риска для матери и плода/ребенка.

Влияние на способность управлять автомобилем или другими механизмами

Не влияет на способность управлять автотранспортом или работать с движущимися механизмами.


Форма выпуска:

По 12 таблеток в блистер из ПВХ, покрытый алюминиевой фольгой; 1 или 2 блистера с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта.

Производитель:

Др. Тайсс Натурварен ГмбХ Мишелинштрассе 10,
66424 Хомбург, Германия

Представительство в Республике Беларусь:

ИООО "НАТУСАНА" 220114 Минск,
ул. Франциска Скорины, 8-29.
тел./факс (017) 399-69-65