


**ИНСТРУКЦИЯ**  
по медицинскому применению лекарственного средства  
**БРОНХОСТОП® Сироп**  
(информация для пациентов)



**Состав лекарственного средства:**

1 мл содержит:

*Действующие вещества:*

Сухой экстракт травы тимьяна – 8 мг

(соотношение сырья к экстрагенту 7 – 13 : 1, экстрагент: вода)

Жидкий экстракт корня алтея – 55,3 мг

(соотношение сырья к экстрагенту 1 : 13, экстрагент: вода)

*Вспомогательные вещества:*

Мальтодекстрин, акация, сок малины (содержит сахарозу, глюкозу и фруктозу), ксилит (Е 967), ксантановая камедь, кислота лимонная моногидрат, метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), ароматизатор малиновый (синтетические и натуральные ароматизаторы, пропиленгликоль (Е 1520)), вода очищенная.

**Международное непатентованное название.**

Отсутствует.

**Лекарственная форма.**

Сироп.

**Описание.**

Вязкая, коричневая жидкость с характерным запахом (тимьяна).

**Название и местонахождение производителя.**

Квизда Фарма ГмбХ

Kwizda Pharma GmbH

Эффингергассе 21, 1160 Вена, Австрия

Effingergasse 21, 1160 Vienna, Austria.

**Фармакотерапевтическая группа:** Отхаркивающие средства в комбинации.

**Код АТС:** R05CA10.

**Фармакологические свойства.**

Компоненты лекарственного средства облегчают отхаркивание мокроты, способствуют уменьшению раздражения слизистой оболочки верхних дыхательных путей и связанного с ним кашля.

**Показания к применению.**

Применяется в комплексной терапии острых респираторных заболеваний для

уменьшения раздражения глотки и в качестве отхаркивающего средства. Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

### **Противопоказания.**

Повышенная чувствительность к действующим веществам, другим растениям семейства Губоцветных (Lamiaceae) или к любому из вспомогательных веществ.

Детский возраст до 4 лет.

### **Меры предосторожности.**

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, развиваются нарушения дыхания, появляется кашель с гнойной мокротой и др.), необходимо обратиться к врачу.

В связи с отсутствием достаточных данных и необходимости медицинского наблюдения не рекомендуется для применения у детей в возрасте до 4 лет.

БРОНХОСТОП Сироп содержит консерванты метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат. Они могут вызвать развитие реакций гиперчувствительности, включая реакции замедленного типа.

Препарат содержит малиновый сок (который содержит сахарозу, глюкозу и фруктозу). Пациенты с редкими наследственными проблемами непереносимости фруктозы (НФИ), мальабсорбции глюкозы-галактозы или недостаточности сахаразы-изомальтазы не должны принимать это лекарственное средство.

Аддитивный эффект одновременно применяемых продуктов, содержащих фруктозу (или сорбит) и диетическое употребление фруктозы (или сорбита), должен быть принят во внимание.

Препарат содержит 4,61 г ксилита в одной дозе 15 мл, который может иметь слабительный эффект. Энергетическая ценность 2,4 ккал / г ксилита.

Препарат содержит 33,3 мг пропиленгликоля в одной дозе 15 мл.

### ***Период беременности и кормления грудью.***

Безопасность применения лекарственного средства во время беременности и лактации не доказана.

В связи с отсутствием достаточных данных прием во время беременности и кормления грудью не рекомендован.

### ***Влияние на способность управлять автотранспортом или работу с механизмами.***

Исследований в отношении воздействия на способность управлять транспортным средством и работать с механизмами не проводилось.

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

### **Способ применения и дозировка.**

Для приема внутрь, в неразбавленном виде.

Если требуется, препарат БРОНХОСТОП сироп можно применять разбавленным водой или теплым чаем.

Взрослым и детям старше 12 лет: 15 мл каждые 3-4 часа (4 – 6 раз в сутки; максимальная суточная доза до 90 мл).

Детям от 4 до 12 лет: 7,5 мл каждые 3-4 часа (4 – 6 раз в сутки; максимальная суточная доза до 45 мл).

Дети до 4 лет: применение у детей в возрасте до 4 лет не рекомендуется.

### **Продолжительность применения**

Самолечение с использованием препарата БРОНХОСТОП Сироп не должно продолжаться более 5 дней. Если в течение 5 дней улучшения состояния не происходит, необходимо обратиться к врачу.

### **Передозировка.**

О случаях передозировки не сообщалось.

### **Побочное действие.**

Аллергические реакции (включая анафилактический шок и отек Квинке), а также желудочно-кишечные расстройства были зарегистрированы в связи с применением лекарственных средств, содержащих тимьян. Частота возникновения не известна.

В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.**

Исследования взаимодействия не проводились.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Срок годности.** 3 года.

После первого открытия флакона хранить 4 недели.

Не использовать после истечения срока годности.


### **Условия хранения.**

Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка.**

По 120 мл сиропа во флаконах из коричневого стекла гидролитического класса



III с наливным носиком и полиэтиленовым навинчивающимся колпачком с кольцом для контроля первого вскрытия. Полипропиленовый мерный стаканчик со шкалой от 2,5 мл до 20 мл.

По 1 флакону с инструкцией по медицинскому применению в картонной коробке.

**Условия отпуска.**

Отпускается без рецепта.

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь