

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению лекарственного средства**  
**БРОНХОСТОП® Пастилки**  
**(информация для пациентов)**

**Состав лекарственного средства:****Одна пастилка (2 г) содержит:***Действующие вещества:*

сухой экстракт травы тимьяна (7-13:1, экстрагент: вода) – 59,5 мг.

*Вспомогательные вещества:*

акация, фруктоза, сорбита раствор некристаллизирующийся (Е 420), кислота лимонная безводная, сахарин натрия, ароматизатор аронии, ароматизатор ягодный, масло минеральное, воск белый, вода очищенная.

**Лекарственная форма.**

Пастилки.

Пастилки гексагональной формы, вогнутые с одной стороны, полупрозрачные, коричневого цвета, с фруктовым вкусом. Допускается присутствие пузырьков воздуха.

**Название и местонахождение производителя.**


Bolder Arzneimittel GmbH & Co. KG (Rheinische Allee 11, 50858 Köln, Germany) for Kwizda Pharma GmbH (Effingergasse 21, 1160 Vienna, Austria).

Болдер Арзнеимиттел ГмбХ и Ко. КГ (Рхеинисче проспект 11, 50858 Кельн, Германия) для Квизда Фарма ГмбХ (Эффингергассе 21, 1160 Вена, Австрия).

**Фармакотерапевтическая группа.**

Отхаркивающие средства.

Код АТС: R05CA.

**Фармакологические свойства.**

Ингредиенты тимьяна обладают секретолитическими, секретомоторными свойствами и облегчают отхаркивание мокроты.

**Показания.**

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Противопоказания.**

Повышенная чувствительность к действующим веществам, другим растениям семейства губоцветных (*Lamiaceae*) или любому из вспомогательных веществ.

Непереносимость фруктозы.

Дети младше 6 лет.

**Особые указания.**

В связи с отсутствием данных и из-за риска случайного проглатывания целой пастилки, не рекомендуется к применению у детей младше 6 лет.

Препарат содержит фруктозу, сорбит, сахарин. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы не следует применять это лекарственное средство.

1 пастилка соответствует примерно 0,1 ВЕ (хлебных единиц). Это следует учитывать пациентам с сахарным диабетом.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, развиваются нарушения дыхания, появляется кашель с гнойной мокротой и др.), необходимо обратиться к врачу.

**Период беременности и кормления грудью.**

Безопасность применения лекарственного средства во время беременности и лактации не доказана.

В связи с отсутствием достаточных данных прием во время беременности и кормления грудью не рекомендуется.

**Влияние на способность управлять автотранспортом или другими механизмами.**

Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

**Способ применения и дозы.**

*Взрослые и подростки старше 12 лет:*

Применяют по 1 пастилке каждые 3-4 часа (4-6 раз в сутки).

При необходимости дозу для взрослых и подростков старше 12 лет можно увеличить до 2 пастилок за прием.

*Дети от 6 до 12 лет:*

Применяют по 1 пастилке 3 раза в день.

*Дети в возрасте до 6 лет:*

Прием детьми до 6 лет не рекомендуется.

*Способ применения:*

Пастилку следует медленно рассасывать.

*Продолжительность лечения:*

Самолечение с использованием препарата не должно продолжаться более 5 дней.

Если в течение 5 дней улучшения состояния не происходит, необходимо обратиться к врачу.

**Передозировка.**

Отсутствуют сведения о случаях передозировки.

При случайной передозировке следует обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

**Побочные эффекты.**

Наблюдались аллергические реакции (в том числе один случай анафилактического шока и один случай отека Квинке), а также желудочно-кишечные расстройства. Частота возникновения неизвестна.

В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Взаимодействий с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.**

Исследования взаимодействия не проводились.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

**Срок годности.**


3 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения.**

Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света месте.


Хранить в недоступном для детей месте.



**Упаковка.**

По 10 пастилок герметически упакованы в контурно-ячейковую упаковку из ПЭИО поливинилхлоридной пленки и алюминиевой фольги.

По два блистера с инструкцией по применению в коробке из картона.

**Условия отпуска.**

Отпускается без рецепта.