


**Листок-вкладыш  
лекарственного средства  
ЗОКСИТИН**

- *Перед использованием лекарственного средства ЗОКСИТИН вы должны проконсультироваться с врачом.*
- *Внимательно прочитайте весь листок-вкладыш перед тем, как начать прием/использование этого лекарственного средства, так как он содержит важную для Вас информацию.*
- *Для достижения оптимальных результатов лекарственное средство следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции (листочке-вкладыше).*
- *Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.*
  - *Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.*
- *Обратитесь к врачу, если Ваше состояние ухудшилось или улучшение не наступило после проведенного лечения.*
- *Это лекарственное средство прописано только Вам. Не передавайте его другим лицам. Это может нанести им вред, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.*

**Торговое название препарата**  
ЗОКСИТИН

**Международное непатентованное название (МНН)**  
Zinc oxide



**Форма выпуска**  
Мазь для наружного применения.

**Общая характеристика**  
Однородная мазь с небольшим зернением, белого или белого с желтоватым оттенком цвета, с характерным запахом.

**Состав лекарственного средства**  
1 г мази содержит:  
*активное вещество:* цинка оксид 400 мг;  
*вспомогательные вещества:* масло печени трески, ланолин безводный, парафин мягкий, тальк, лимонное масло, метилпарагидроксибензоат (нипагин), бутилгидроксианизол, вода очищенная.

**Фармакотерапевтическая группа:** Препараты со смягчающим и защитным действием. Препараты цинка.  
**Код АТХ:** D02AB.

**Показания для применения**  
«Пеленочный» дерматит, опрелость, небольшие поверхностные раны, ожоги, порезы, царапины, ссадины, варикозные язвы, пролежни, экзема в стадии обострения.

**Способ применения и дозировка**

Наружно.

*«Пеленочный» дерматит, опрелость у детей грудного возраста*

*Лечение:* перед применением необходимо вымыть и высушить пораженную область. При появлении первых признаков покраснения, опрелости или небольшого раздражения кожи мазь наносят на кожу 3-6 раз в сутки (обычно при смене пеленок или памперсов).

*Профилактика:* мазь наносят на кожу, покрываемую пеленкой или памперсами, до начала появления признаков раздражения (особенно перед сном), когда ребенок может долгое время находиться в мокрых пеленках (подгузниках, памперсах).

*Раны и ожоги:* мазь наносят тонким слоем на очищенную кожу (при необходимости накладывают марлевую повязку), только на поверхностные и неинфицированные поражения до 2-3 раз в день.

**Побочное действие**

Возможны реакции гиперчувствительности: сыпь, местное раздражение кожных покровов.

В случае возникновения побочных эффектов необходимо обратиться к врачу.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Передозировка**

До настоящего времени о случаях передозировки препарата не сообщалось.

Если средство по ошибке принято внутрь в больших количествах, оно может вызвать рвоту, диарею, возбуждение ЦНС и судороги. При необходимости назначается симптоматическое и поддерживающее лечение.

**Меры предосторожности**

Мазь предназначена только для наружного применения!

Избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки.

Если «пеленочный» дерматит или опрелость не исчезают в течение 48-72 часов от начала применения препарата, необходимо обратиться к врачу.

В состав лекарственного средства входят ланолин и бутилгидроксианизол, которые могут вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит); нипагин (производное парагидроксибензоата), способный вызвать аллергические реакции. Бутилгидроксианизол также может раздражать глаза и слизистые оболочки.

**Беременность и лактация**

Данные о доклинических исследованиях на животных отсутствуют. Контролируемые клинические исследования не проводились. Следует избегать применения препарата во время беременности и кормления грудью. В случае необходимости лекарственное средство назначается по рекомендации и под наблюдением врача, если ожидаемая польза для женщины перевешивает риск для плода/ребенка.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами и потенциально опасными механизмами**

Зокситин мазь 400 мг/г не влияет на способность к вождению и управлению механизмами.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

До настоящего времени при наружном использовании мази взаимодействия с другими лекарственными средствами не выявлено.

**Условия и срок хранения**

Хранить при температуре не выше 25°C. Не замораживать.

Срок годности - 3 года.

Не применять после истечения срока годности.

Хранить в недоступном для детей месте!

**Условия отпуска**

Без рецепта врача.

**Упаковка**

Мазь, содержащая в 1 грамме 400 мг цинка оксида. По 40 г мази в алюминиевой тубе, по 1 тубе вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

**Информация о производителе**

ООО «ФАРМАПРИМ»

ул. Кринилор, 5, с. Порумбень, р-он Криулень,

Республика Молдова, MD-4829

тел.: (+373-22)-28-18-45, тел./факс: (+373-22)-28-18-46

[www.farmaprim.md](http://www.farmaprim.md)