

**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА**

**ДЕТРАЛЕКС® 500 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой**  
**микронизированная очищенная флавоноидная фракция**

**Внимательно прочтите этот вкладыш до конца перед тем, как начать прием препарата, так как он содержит важную информацию для вас.**

Если у вас возникли дополнительные вопросы, или вы сомневаетесь в приеме данного препарата, обратитесь к своему лечащему врачу или фармацевту.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться прочитать его снова.
- Если вам требуется дополнительная информация или совет, обратитесь к фармацевту.
- Если симптомы усилились или ваше состояние не улучшилось, вы должны обратиться к врачу.
- Если побочные эффекты приобретают серьезный характер или если вы отметили побочные действия, которые не перечислены в этом вкладыше, сообщите об этом своему врачу или фармацевту.

**В этом вкладыше содержится следующая информация:**

1. ЧТО ТАКОЕ ДЕТРАЛЕКС, 500 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, И В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ
2. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ ПРИЕМ ДЕТРАЛЕКСА, 500 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
3. КАК ПРИНИМАТЬ ДЕТРАЛЕКС, 500 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
5. КАК ХРАНИТЬ ДЕТРАЛЕКС, 500 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**СОГЛАСОВАНО**

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
 Приказ Министерства здравоохранения  
 Республики Беларусь

от «19» 12 2019 г. № 1510

1. ЧТО ТАКОЕ ДЕТРАЛЕКС, 500 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, И В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Данный препарат является венотоником (увеличивает тонус вен) и ангиопротектором (увеличивает резистентность мелких кровеносных сосудов).

Он рекомендован для лечения

- нарушений венозного кровообращения (тяжость в ногах, боль, синдром усталых ног по утрам) и
- лечения симптомов, связанных с приступами острого геморроя.

2. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ ПРИЕМ ДЕТРАЛЕКСА, 500 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой?

**Не принимайте ДЕТРАЛЕКС, 500 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой:**

Если у вас аллергия (гиперчувствительность) на микронизированную флавоноидную фракцию или любой другой компонент препарата.

**Будьте особенно осторожны при приеме ДЕТРАЛЕКСА, 500 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой:**

**Приступ геморроя:**

Если симптомы, связанные с геморроем, не проходят в течение 15 дней, то вам необходимо проконсультироваться с вашим врачом.

**Расстройства венозного кровообращения:**

Лечение является наиболее эффективным в сочетании со здоровым образом жизни.

- Избегайте чрезмерного пребывания на солнце, жары, длительного стояния на ногах, избыточного веса
- Ходите, при необходимости надевая чулки, способствующие улучшению кровообращения

**Прием других препаратов**

Пожалуйста, сообщайте своему врачу или фармацевту, какие препараты вы принимаете или недавно принимали, в том числе препараты, отпускаемые без рецепта.

**Беременность и кормление грудью**

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что вы беременны или планируете завести ребенка, проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем принимать данное лекарственное средство.

**Беременность**

В качестве меры предосторожности предпочтительно избегать применения Детралекса во время беременности.

**Кормление грудью**

Кормление грудью не рекомендуется во время приема этого препарата ввиду отсутствия данных о проникновении препарата в грудное молоко.

**Применение у детей**

Нет данных.

**Вождение автотранспорта и управление механизмами**

ДЕТРАЛЕКС не влияет или влияет ничтожно мало на способность к вождению автотранспорта и управление механизмами.

**3. КАК ПРИНИМАТЬ ДЕТРАЛЕКС, 500 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой?**

НД РБ

9343 - 2019

### Дозировка

Венозная недостаточность: 2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, в день: 1 таблетка днем и 1 таблетка вечером, во время еды.

Приступ геморроя: 6 таблеток в день в течение 4 дней, затем по 4 таблетки в день в течение 3 дней, во время еды.

### Способ применения

Таблетку проглатывают, запивая стаканом воды.

### Частота применения

В обед и вечером во время еды.

### Продолжительность лечения

Если вы принимаете данное лекарственное средство для лечения геморроя, и ваша проблема сохраняется более 15 дней, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

**Если вы забыли принять ДЕТРАЛЕКС, 500 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой**

Не удваивайте последующую дозу.

Если вы приняли больше таблеток ДЕТРАЛЕКСА, чем вам назначено, то немедленно обратитесь к своему лечащему врачу или фармацевту.

Данные о передозировке Детралексом ограничены, но сообщаемые признаки включают диарею, тошноту, боль в животе, зуд и сыпь.

## 4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Как и остальные лекарственные препараты, ДЕТРАЛЕКС, 500 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, может вызывать побочные действия, хотя и не у каждого пациента.

Частота возможных нежелательных эффектов определяется в соответствии с критериями, приведенными ниже:

Очень часто (наступает более чем у 1 пациента из 10)

Часто (наступает у 1-10 пациентов из 100)

Нечасто (наступает у 1-10 пациентов из 1000)

Редко (наступает у 1-10 пациентов из 10 000)

Очень редко (наступает менее чем у 1 пациента из 10 000)

Частота неизвестна (частота не может быть оценена на основании доступных данных)

К ним относятся:


- Часто: диарея, диспепсия, тошнота, рвота.

- Нечасто: колит.

- Редко: головокружение, головная боль, недомогание, сыпь, зуд, крапивница.

- Частота неизвестна: боль в животе, изолированный отек лица, губ, век. В исключительных случаях: отек Квинке.





Если побочные эффекты приобретают серьезный характер или нежелательные эффекты, не перечисленные в этом вкладыше, сообщите об этом своему врачу или фармацевту.

Сообщая о побочных эффектах, вы поможете собрать больше информации о безопасности данного препарата.

## 5. КАК ХРАНИТЬ ДЕТРАЛЕКС, 500 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Держать вне досягаемости и вне видимости детей.

Не принимать ДЕТРАЛЕКС по истечении срока годности, указанного на упаковке. При указании срока годности имеется в виду последний день указанного месяца.

Хранить при температуре не выше 30°C.

Хранить в оригинальной наружной упаковке.

Срок хранения: 4 года

Лекарственные средства не должны выбрасываться в сточные воды или в канализацию. Спросите у фармацевта, как выбросить лекарства, которые вы больше не используете. Эти меры направлены на защиту окружающей среды.

## 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Что содержит ДЕТРАЛЕКС, 500 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой:

Микронизированная очищенная флавоноидная фракция, 500 мг

Количество, соответствующее:

Диосмин: 90% 450 мг

Флавоноиды эквивалентно гесперидину: 10 % 50 мг

Среднее содержание влаги: 20 мг

На одну таблетку, покрытую пленочной оболочкой

### Вспомогательные вещества:

Натрия крахмалгликолят тип А, микрокристаллическая целлюлоза, желатин, магния стеарат, тальк.

Пленочное покрытие: титана диоксид (E171), глицерол, натрия лаурилсульфат, макрогол 6000, гипромеллоза, железа оксид желтый (E172), железа оксид красный (E172), магния стеарат.

### Как выглядит ДЕТРАЛЕКС, 500 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и содержимое упаковки:

Овальные таблетки оранжево-розового цвета, покрытые пленочной оболочкой.

9343 - 2019

**СОГЛАСОВАНО**

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

- Пачка, содержащая 30 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, ячейковые упаковки, каждая из которых содержит 15 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, а также листок-вкладыш с информацией для пациента, вложенные в картонную пачку.

- Пачка, содержащая 60 таблеток, покрытых пленочной оболочкой: 4 контурные ячейковые упаковки, каждая из которых содержит 15 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, а также листок-вкладыш с информацией для пациента, вложенные в картонную пачку.

Не все расфасовки могут иметься в продаже.

**Отпуск из аптек:**

Без рецепта

**Владелец регистрационного удостоверения и Изготовитель**

**Владелец регистрационного удостоверения**

Les Laboratoires Servier  
«Ле Лаборатуар Сервье»  
50 rue Carnot  
92284 Suresnes Cedex France - Франция

**Изготовитель**

ООО «СЕРВЬЕ РУС»  
108828, г. Москва, поселение Краснопахорское, квартал 158, владение 2, стр. 1, Россия.

По любым вопросам о данном лекарственном средстве, пожалуйста, обращайтесь в местное представительство Владельца регистрационного удостоверения.

**БЕЛАРУСЬ**

Ул. Мясникова, 70, офис 303  
220030 Минск, Республика Беларусь  
Тел.: +375 173 06 54 55