


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ЛИСТОК - ВКЛАДЫШ

(информация для пациента)

по медицинскому применению лекарственного средства

Ампициллина тригидрат

Торговое название: Ампициллина тригидрат.

Международное непатентованное название: Ампициллин/Ampicillin.

Лекарственная форма: таблетки 250 мг.

Описание: таблетки белого цвета, плоскоцилиндрические, с риской и фаской.

Состав: 1 таблетка содержит: *действующего вещества* – ампициллина (в виде ампициллина тригидрата) - 250 мг; *вспомогательные вещества:* крахмал картофельный, тальк, кальция стеарат, кроскармеллоза натрия.

Фармакотерапевтическая группа: Бета-лактамы антибиотики. Пенициллины широкого спектра действия. Ампициллин.

Код АТХ: J01CA01.

Показания к применению

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к действию ампициллина тригидрата микроорганизмами; воспалительные заболевания верхних дыхательных путей (фарингиты, ларингиты, бронхиты); острые и хронические тонзиллиты (ангины); отиты и синуситы; инфекции моче- и желчевыводящих путей (пиелит, пиелонефрит, цистит, холангит, холецистит); инфекции желудочно-кишечного тракта, в том числе дизентерии, иерсиниозы, сальмонеллезноительство.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность (в том числе к другим пенициллинам, цефалоспорином, карбапенемам), инфекционный мононуклеоз, лимфолейкоз, тяжелые нарушения функции печени, детский возраст (до 4 лет).

Способ применения и дозы

Дозу и продолжительность лечения устанавливают индивидуально в зависимости от тяжести течения, локализации инфекции и чувствительности возбудителя.

Внутрь, за 0,5 – 1 час до еды, взрослым - по 250 мг (1 таблетка) 4 раза в день. При необходимости дозу увеличивают до 3 г (12 таблеток) в сутки.

Детям в возрасте старше 4 лет назначают по 1 – 2 г (4 – 8 таблеток) в сутки. Суточную дозу делят на 4 приема.

Побочное действие

Аллергические реакции: крапивница, эритема, ангионевротический отек, ринит, конъюнктивит, редко – лихорадка, боли в суставах, эозинофилия, крайне редко – анафилактический шок.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота.

Эффекты, обусловленные химиотерапевтическим действием: кишечный дисбактериоз, псевдомембранозный колит, вызываемый *C. difficile*, кандидоз полости рта, вагинальный кандидоз.

Со стороны системы кроветворения: редко – лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, анемия, удлинение времени кровотечения и повышение уровня протромбина.

Со стороны почек: интерстициальный нефрит.

Со стороны печени: транзиторное повышение уровня печеночных трансаминаз, гепатит, холестатическая желтуха.

В случае проявления вышеуказанных, а так же не описанных в данном листке-вкладыше реакций, следует прекратить прием и немедленно обратиться к лечащему врачу.

Лекарственное взаимодействие

Ампициллина тригидрат снижает эффект оральных контрацептивов, увеличивает – антикоагулянтов, антибиотиков аминогликозидного ряда. Аллопуринол повышает вероятность появления кожной сыпи. Пробенецид при одновременном применении с ампициллином снижает канальцевую секрецию последнего, в результате чего повышается концентрация ампициллина в плазме крови и возрастает риск развития токсического действия.

Особые указания

С осторожностью применять при бронхиальной астме, сенной лихорадке и других аллергических состояниях.

В процессе лечения ампициллином необходим систематический контроль функции почек, печени и картины периферической крови.

Беременность и лактация

Возможность применения ампициллина тригидрата во время беременности и в период грудного вскармливания определяет врач.

Влияние на лабораторные показатели: при определении содержания глюкозы в моче химическими методами возможна ложноположительная реакция. Рекомендуется во время приема ампициллина применять глюкозооксидазный метод определения глюкозы в моче.

Влияние на способность вождения автомобиля и работу с движущимися механизмами: в период лечения необходимо воздерживаться от вождения автотранспорта и занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Передозировка

Симптомы: при применении очень высоких доз может проявляться токсическое просудорожное действие на центральную нервную систему (особенно у больных с почечной недостаточностью).

Лечение: симптоматическое. В случае проявления описанной реакции следует прекратить прием и обратиться к лечащему врачу.

Упаковка

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке № 10 х 2.

По 10 таблеток в контурной безъячейковой упаковке № 10 х 1.

Условия хранения

В защищенном от света и влаги месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не применять после окончания срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту врача.

Подлежит отпуску без рецепта врача только в период эпидемии гриппа.

Производитель

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64/27, e-mail: market@borimed.com, тел/факс +375(177)735612.