


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ЛИСТОК - ВКЛАДЫШ

(информация для пациентов)

по медицинскому применению лекарственного средства

Хиндиокс

Торговое название: Хиндиокс.

Форма выпуска: раствор для внутриполостного и наружного применения 10 мг/мл.

Описание: прозрачная зеленовато-желтая жидкость.

Состав: каждая ампула (5 мл) содержит: *действующее вещество:* диоксидин – 50 мг; *вспомогательные вещества:* вода для инъекций.

Фармакотерапевтическая группа: прочие антибактериальные средства. Код АТХ – J01XX.

Показания к применению


Гнойные бактериальные инфекции, вызванные чувствительной микрофлорой, при неэффективности других химиотерапевтических средств или плохой их переносимости.

Внутриполостное введение - гнойные процессы в грудной и брюшной полости при гнойных плевритах, эмпиеме плевры, абсцессах лёгких, перитонитах, циститах; раны с глубокими гнойными полостями (абсцессы мягких тканей, флегмоны тазовой клетчатки, послеоперационные раны моче- и желчевыводящих путей, гнойный мастит); профилактика инфекционных осложнений после катетеризации мочевого пузыря.

Наружное применение - поверхностные и глубокие раны различной локализации; раны и трофические язвы, которые долго не заживают; флегмоны мягких тканей; инфицированные ожоги; гнойные раны при остеомиелите.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость препарата, ~~недостаточность коры надпочечников~~ (в т.ч. в анамнезе).



Способ применения и дозы

Диоксидин назначают только взрослым. Перед началом лечения проводят пробу на переносимость препарата, для чего вводят в полость 10 мл раствора Хиндиокса 10 мг/мл. При отсутствии в течение 3-6 часов побочных явлений (головокружения, озноба, повышения температуры тела) начинают курсовое лечение.


Внутриполостное введение. Вводят обычно 10-50 мл раствора Хиндиокса 10 мг/мл в полость через дренажную трубку, катетер или шприц. Максимальная суточная доза составляет 70 мл раствора 10 мг/мл. Применяют 1 или 2 раза в день (не превышая суточной дозы 70 мл раствора Хиндиокса 10 мг/мл). Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания и переносимости препарата. При хорошей переносимости курс лечения может продолжаться 3 недели и больше. При необходимости курс лечения повторяют через 1 - 1,5 месяца.

Наружное применение. Применяют раствор концентрацией 1-10 мг/мл. Для получения раствора концентрацией 1-2 мг/мл ампульный раствор препарата разводят до нужной концентрации стерильным 0,9 % раствором натрия хлорида или водой для инъекций. Для лечения поверхностных инфицированных гнойных ран на рану накладывают салфетки, смоченные раствором концентрацией 5-10 мг/мл. Глубокие раны после обработки рыхло тампонируют тампонами, смоченными раствором Хиндиокса 10 мг/мл, а при наличии дренажной трубки в полость вводят 20-100 мл раствора концентрацией 5 мг/мл.

Для лечения глубоких гнойных ран при остеомиелите (раны кисти, стопы) применяют раствор лекарственного средства концентрацией 5-10 мг/мл в виде ванночек или проводят специальную обработку раны раствором в течение

15-20 минут (введение в рану раствора на этот срок) с последующим наложением повязки с использованием раствора Хиндиокса 10 мг/мл.

Раствор концентрацией 1-5 мг/мл можно применять для профилактики и лечения инфекции после оперативных вмешательств. По показаниям (больные с остеомиелитом) и при хорошей переносимости лечения препарат можно применять ежедневно в течение 1,5-2 месяцев.



Побочное действие

При внутримышечном введении возможны головная боль, озноб, повышение температуры тела, диспепсические расстройства, судорожные сокращения мышц, аллергические реакции, фотосенсибилизирующий эффект (появление пигментных пятен на теле при воздействии солнечных лучей).

При наружном применении – околораневый дерматит, зуд.

Меры предосторожности

Хиндиокс назначают в условиях стационара. Экспериментально выявлено тератогенное и эмбриотоксическое действие (поэтому он противопоказан при беременности); препарат оказывает также мутагенное действие. В связи с этим диоксидин назначают только при тяжёлых формах инфекционных заболеваний или при неэффективности других антибактериальных препаратов, в том числе цефалоспоринов II-IV поколений, фторхинолонов, карбапенемов. Не допускается бесконтрольное применение диоксида и лекарственных форм, которые его содержат.

С осторожностью применяют при почечной недостаточности, при хронической почечной недостаточности дозу уменьшают.

При появлении пигментных пятен увеличивают продолжительность введения дозы до 1,5 - 2 часов, снижают дозу, назначают антигистаминные препараты, а в случае необходимости прекращают применение препарата.

Дети

Противопоказан детям.

Применение при беременности и в период лактации

Диоксидин противопоказан при беременности и в период лактации.

Влияние на способность управлять транспортом и потенциально опасными механизмами

В период лечения следует соблюдать осторожность при управлении автотранспортом или занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не описано.

Передозировка

Возможно развитие острой надпочечниковой недостаточности.

Лечение: немедленная отмена препарата, соответствующая заместительная гормонотерапия.

Упаковка

В ампулах по 5 мл в упаковке №10, №5х2 вместе с листком-вкладышем.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре от 15 °С до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

При кратковременном изменении условий хранения в процессе транспортировки (температура ниже 15 °С) в ампулах возможно выпадение кристаллов, которые растворяются при интенсивном встряхивании при температуре от 15 °С до 25 °С.

Срок годности

2 года. Не использовать после окончания срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Информация о производителе

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375(177)735612, 731156.

