

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1608 5 833

ИНСТРУКЦИЯ
(информация для пациентов)
по медицинскому применению лекарственного средства
ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА

Торговое название: Искусственная слеза.

Международное непатентованное название: нет

Форма выпуска: раствор (капли глазные).

Описание: прозрачная бесцветная или желтоватого цвета жидкость.

Состав на одну тюбик-капельницу: активные вещества: гипромеллозы (Метоцел Е4М Премиум) – 3,0 мг, декстрана 60 – 1,0 мг;

вспомогательные вещества: динатрия фосфат дигидрат, натрия дигидрофосфат дигидрат, натрия хлорид, динатрия эдэтат, бензалкония хлорид, вода для инъекций.

Фармакотерапевтическая группа: Искусственные слезы и прочие индифферентные препараты.

Код АТС: S01XA20.

Фармакологическое действие

Препарат для увлажнения роговицы. Искусственная слеза содержит компоненты, которые в сочетании с естественной слезной жидкостью глаза повышают стабильность слезной пленки. Препарат восполняет дефицит слезной жидкости и улучшает увлажнение роговицы. После однократного закапывания действие препарата сохраняется в течение 90 минут.

Показания к применению

- синдром сухого глаза;
- облегчение роговичного синдрома (в т.ч. дискомфорт, жжение, чувство инородного тела).

Способ применения и дозы

В конъюнктивальный мешок. По 1-2 капли по мере необходимости.

При отсутствии эффекта следует прекратить закапывание препарата.

Рекомендации по использованию тюбик-капельницы: перед применением лекарственного средства снять с тюбик-капельницы защитный колпачок, ножницами отрезать мембрану горловины корпуса, не повреждая резьбовую часть. Перевернуть корпус тюбик-капельницы с лекарственным средством горловиной вниз и мягким движением нажать на корпус тюбик-капельницы, используя его как пипетку. После применения рекомендуемой по назначению врача или указанной в инструкции по применению лекарственного средства дозы, корпус тюбик-капельницы перевернуть резьбовой частью вверх и накрутить защитный колпачок.

Побочное действие

Частота развития побочных эффектов приведена в следующей градации: очень часто ($\geq 1/10$); часто ($\geq 1/100, < 1/10$); нечасто ($\geq 1/1000, < 1/100$); редко ($\geq 1/10000, < 1/1000$); очень

редко (<1/10000); неизвестно (по имеющимся данным определить частоту встречаемости не представляется возможным).

Со стороны иммунной системы: неизвестно: гиперчувствительность.

Со стороны нервной системы: нечасто: головная боль.

Со стороны органа зрения: очень часто: затуманивание зрения; часто: остаточная сухость глаза, заболевания век, непривычные ощущения в глазу; нечасто: светобоязнь, гипестезия глаза, зуд, раздражение глаз, гиперемия конъюнктивы; неизвестно: эритема век, отек глаз, боль в глазах, выделения из глаз, блефарит, повышенное слезоотделение.

Общие нарушения: дискомфорт (со стороны кожи).

В случае возникновения вышеупомянутых побочных реакций или побочных реакций, не указанных в данной инструкции по медицинскому применению лекарственного средства, необходимо обратиться к врачу.

Противопоказания

Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата; детский возраст (данных о возможности применения препарата у детей нет).

Передозировка

При местном применении передозировка маловероятна.

Лечение: следует промыть глаза обильным количеством теплой воды.

Меры предосторожности

Контактные линзы необходимо снять перед закапыванием и надеть через 15 минут.

Применение во время беременности и лактации. Адекватных и контролируемых исследований у беременных женщин и кормящих матерей не проводилось.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами. После закапывания возможна временная неясность зрения или другие проявления зрительного дискомфорта (неудобства и т.п.), что может негативно повлиять на способность управлять автомобилем или другими потенциально опасными механизмами. В этом случае необходимо подождать некоторое время до восстановления зрения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При назначении Искусственной слезы вместе с другими местными офтальмологическими препаратами необходимо соблюдать интервал между закапываниями как минимум в 10-15 минут. Глазные мази следует использовать после Искусственной слезы.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25⁰C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Вскрытую тюбик-капельницу хранить в защищенном от света месте при температуре от 15⁰C до 25⁰C в течение 14 суток.

Срок годности

2 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка

По 1 мл в тюбик-капельницы; по 2 тюбик-капельницы вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачку из картона или по 2 тюбик-капельницы в контурную ячейковую упаковку. Одну контурную ячейковую упаковку вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Отпуск из аптек

Без рецепта.

Производитель:

РУП "Белмедпрепараты".
Республика Беларусь, 220007, г. Минск,
ул. Фабрициуса, 30, т./ф.: (+375 17) 220 37 16,
e-mail: medic@belmedpreparaty.com

