


# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



## ИНСТРУКЦИЯ (информация для пациентов) по медицинскому применению лекарственного средства **СУЛЬФАЦИЛ-БЕЛМЕД**

**Торговое название:** Сульфацил-Белмед.

**Международное непатентованное название:** Sulfacetamide.

**Описание:** прозрачный слегка желтоватый раствор.

**Состав:** активное вещество – сульфацетамида натрия (сульфацила натрия) – 200 мг/мл; вспомогательные вещества: натрия тиосульфат, вода для инъекций.

**Фармакотерапевтическая группа:** Препараты для лечения заболеваний глаз.  
Противомикробные препараты. Сульфацетамид.

**Лекарственная форма:** раствор (капли глазные) 200 мг/мл.

**Код АТС:** S01AB04.

### **Фармакологическое действие**

Сульфацил-натрия — сульфаниламидный антимикробный препарат широкого спектра действия. Обладает бактериостатическим действием. Механизм действия связан с конкурентным антагонизмом с пара-аминобензойной кислотой и угнетением дигидроптероатсингетазы, что приводит к нарушению синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и пириимидинов.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе стрептококков, гонококков, кишечной палочки), а также хламидий, актиномицетов.

### **Показания к применению**

В составе комплексной терапии. Инфекционно-воспалительные заболевания глаз, вызванные чувствительными к препаратуре бактериями: конъюнктивиты, блефариты, гнойные язвы роговицы, гонорейные заболевания глаз у взрослых и детей. Профилактика бленфореи у новорожденных. Не рекомендуется применять сульфацил натрия при вирусной или грибковой инфекции глаз. Он используется только для лечения инфекций, вызванных бактериями.

### **Способ применения и дозы**

Местно.

Для лечения конъюнктивита у детей и взрослых, закапывают в конъюнктивальный мешок через каждый час по 1-2 капли раствора, в последующие 3-4 дня 5 - 6 раз в сутки.

Для лечения блефарита у детей и взрослых частота инстилляций в первые дни составляет до 6-8 раз и уменьшается до 3-4 раз в день по мере улучшения состояния, длительность лечения 3-5 дней.

Для лечения гнойной язвы роговицы в составе комплексной терапии в виде инстилляций 5-6 раз в день, в течение 5-7 дней.

С целью профилактики бленфореи у новорожденных по 2 капли в каждый конъюктивальный мешок непосредственно после рождения и по 2 капли через каждые 2 часа в течении суток; для лечения бленфореи в каждый конъюктивальный мешок по 2 капли каждые 1-2 часа в первые сутки, затем каждые 3 часа, продолжительность лечения две недели.

При лечении гонорейных и хламидийных заболеваний глаз у взрослых в составе комплексной терапии по 1-2 капле 5-6 раз в день, в течение 4-6 недель. При положительной динамике на фоне проводимого лечения число инстилляций капель уменьшают в каждую последующую неделю.

*Рекомендации по использованию флаconов с крышками-капельницами:* перед применением препарата удалить с флаconа алюминиевый колпачок, снять резиновую пробку и закрыть флаcon крышкой-капельницей, предварительно освобожденной от упаковки. Затем снять колпачок с крышки-капельницы, перевернуть флаcon, закапать необходимое количество капель препарата. После применения флаcon вернуть в вертикальное положение и надеть колпачок на крышку – капельницу.

*Рекомендации по использованию тюбик-капельниц:* перед применением лекарственного средства снять с тюбик-капельницы защитный колпачок, ножницами отрезать мембрану горловины корпуса, не повреждая резьбовую часть. Перевернуть корпус тюбик-капельницы с лекарственным средством горловиной вниз и мягким движением нажать на корпус тюбик-капельницы, используя его как пипетку. После применения рекомендуемой по назначению врача или указанной в инструкции по применению лекарственного средства дозы, корпус тюбик-капельницы перевернуть резьбовой частью вверх и накрутить защитный колпачок.

Мойте руки перед использованием глазных капель. Не прикасайтесь капельницей или пипеткой к глазам или рукам. Отверстие пипетки и капельницы стерильно. Если она становится загрязненной, то это может вызвать инфекцию глаза. Слегка надавите на внутренний угол глаза (возле носа), после каждой капли для предотвращения вытекания жидкости через слезные протоки.

### **Побочное действие**

В отдельных случаях возможно раздражение тканей глаза (покраснение, зуд, отек век, жжение, слезотечение), аллергические реакции.

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность к компонентам препарата и сульфаниламидам в анамнезе.

### **Передозировка**

*Симптомы:* при частом применении препарата возможно покраснение, зуд, отек век, значительное раздражение слизистой оболочки глаза.

В этом случае лечение продолжают раствором сульфацила меньшей концентрации, в случае необходимости отменяют препарат и назначают симптоматическое лечение.

### **Надлежащие меры безопасности при применении**

Пациенты с повышенной чувствительностью к фуроsemиду, тиазидным диуретикам (гидрохлортиазид), производным сульфонилмочевины (глибенкламид), ингибиторам карбоангидразы (диакарб) могут иметь повышенную чувствительность к сульфацилу. Не используйте другие глазные капли во время лечения сульфацилом натрия, если иное не предписано врачом.

### **Особые предостережения**

*Применение во время беременности и в период лактации.* Неизвестно, какое влияние сульфацил натрия может оказывать на плод. Не рекомендуется использовать сульфацил натрия беременным без консультации врача. Неизвестно, проникает ли сульфацил натрия в грудное молоко. Не рекомендуется использовать сульфацил натрия кормящим матерям без консультации врача.

*Влияние на способность к управлению автотранспортом и другими потенциально опасными механизмами.* Следует соблюдать осторожность при вождении, управлении промышленным оборудованием или при выполнении другой опасной работы. Сульфацил натрия может вызвать ухудшение зрения. Если вы испытываете затуманенное зрение, воздержитесь от опасной деятельности.

**Дети.** Препарат применяют для лечения детей.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

При совместном применение с новокаином, дикаином, аnestезином бактериостатический эффект уменьшается; дифенин, ПАСК, салицилаты усиливают токсичность сульфацила, при применении с антикоагулянтами непрямого действия повышается специфическая активность последних. Сульфацил при местном применении несовместим с солями серебра.

**Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Вскрытый флакон хранить в защищенном от света месте при температуре от 15°C до 25°C в течение 4 недель.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Упаковка**

По 5 мл во флаконах из нейтрального стекла. Флакон в комплекте с крышкой-капельницей и инструкцией по применению помещают в пачку.

По 1 мл или 1,5 мл в тюбик-капельницы. По 2 или 10 тюбик-капельниц в вместе с инструкцией по применению помещают в пачку или по 2 тюбик – капельницы в контурную ячейковую упаковку. Одну контурную ячейковую упаковку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку.

**Отпуск из аптек**

Без рецепта.

---

**Производитель:**  
РУП "Белмедпрепараты",  
Республика Беларусь, 220007, г. Минск,  
ул. Фабрициуса, 30, т./ф.: (+375 17) 220 37 16,  
e-mail: medic@belmedpreparaty.com

---

