

**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА****Иммунал®, капли для внутреннего применения**

**Перед началом применения данного лекарственного препарата внимательно прочтайте всю информацию листка-вкладыша.**

- Сохраните данный листок-вкладыш, возможно, вам понадобится прочитать его еще раз.
- Если у вас возникнут дополнительные вопросы, посоветуйтесь с врачом или фармацевтом.
- Данный лекарственный препарат выписан лично вам. Не передавайте его другим лицам.
- Препарат может им навредить, даже если их симптомы заболевания сходны с вашими.
- В случае возникновения серьезных побочных эффектов или новых побочных эффектов, не упомянутых в данной инструкции, следует немедленно обратиться к врачу или фармацевту.

**Состав**

Активное вещество: 1 мл капель для приема внутрь содержит 0,8 мл сока, полученного из свежесобранных трав эхинацеи пурпурной (*Echinacea purpurea L.*).

Вспомогательные вещества: сорбитол (70% раствора), 96% этиловый спирт.

Лекарственное средство содержит 20% этилового спирта.

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
от « 08 » 01. 2016 № 7

**Описание**

От прозрачного до мутного коричневый раствор с небольшим количеством осадка или агломерата в виде пленки.

**Упаковка**

50 мл капель во флаконе из темного стекла с гидролитической устойчивостью внутренней поверхности III класса с закручивающейся крышкой из ПП или ПЭВП с уплотняющим кольцом из ПЭВП в комплекте с дозировочной пипеткой и листком-вкладышем в картонной коробке.

**ЧТО ТАКОЕ КАПЛИ ИММУНАЛ И ДЛЯ ЧЕГО ОНИ ПРИМЕНЯЮТСЯ**

Действующим веществом капель Иммунал является сок эхинацеи пурпурной.

Механизм действия не установлен.

**Показания к применению**

Кратковременная профилактика и лечение в составе комплексной терапии острых респираторных заболеваний.

**КАК ПРИНИМАТЬ КАПЛИ ИММУНАЛ**

Для профилактики и лечения простудных заболеваний лекарственное средство не следует использовать более 10 дней. При лечении простудных заболеваний прием препарата следует начинать при появлении первых признаков заболевания.

Для приема внутрь.

**Взрослые и подростки старше 12 лет:** по 2,5 мл препарата 3 раза в день.

Применение лекарственного средства у детей до 12 лет не рекомендуется в связи с отсутствием достаточных данных.

В связи с содержанием этилового спирта, принимать с осторожностью пациентам с заболеваниями печени, предварительно проконсультировавшись с врачом.

Для обеспечения правильного дозирования в каждую упаковку вложена градуированная дозировочная пипетка. Перед приемом нужное количество препарата следует развести в небольшом объеме воды. Принимать независимо от приема пищи.

### Продолжительность приема

Курс лечения не должен превышать 10 дней. Если симптомы сохраняются более 10 дней, необходимо проконсультироваться с врачом.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

#### Не принимайте капли Иммунал при следующих состояниях:

- повышенная чувствительность к действующему веществу или растению семейства сложноцветных (ромашка, арника, календула, тысячелистник) или к любому из вспомогательных веществ;
- прогрессирующее системное заболевание, в т.ч. туберкулез, саркоидоз;
- системные заболевания соединительной ткани (коллагенозы);
- рассеянный склероз;
- ВИЧ-инфекция или СПИД;
- злокачественные заболевания;
- патология системы лейкоцитов (гемобластозы, агранулоцитоз и др.);
- состояния иммунодефицита или иммunoупрессии;
- прием иммунодепрессантов;
- склонность к аллергическим реакциям (атопический дерматит, бронхиальная астма и др.);
- беременность, период лактации;
- детский возраст до 12 лет.

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

В связи с содержанием этилового спирта принимать с осторожностью детям старше 12 лет, пациентам с заболеваниями печени, алкоголизмом, эпилепсией, черепно-мозговой травмой и другими заболеваниями головного мозга, предварительно проконсультировавшись с врачом.

### ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

#### Меры предосторожности

Не превышать указанную дозу.

Если во время приема лекарственного средства симптомы не улучшаются или происходит ухудшение состояния, поднимается температура, необходимо обратиться к врачу.

Если у вас имеется склонность к аллергии, то необходимо проконсультироваться с врачом перед приемом препарата.

Применение лекарственного средства у детей до 12 лет не рекомендуется в связи с отсутствием достаточных данных.

При хранении капель (3-6 месяцев) возможно помутнение раствора или образование осадка, состоящего из активных полисахаридов. Перед употреблением тщательно встряхните флакон.

#### Прием других лекарственных средств

Если вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие лекарства, в том числе безрецептурные, сообщите об этом своему врачу или фармацевту.

Исследования по взаимодействию эхинацеи пурпурной с другими лекарственными препаратами не проводились. Однако не рекомендуется применять капли Иммунал в период приема иммunoсупрессивных лекарств, таких как циклоспорин и метотрексат.

Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных средств, содержащих этиловый спирт. Взаимодействия, связанные с наличием в составе этилового спирта: лекарственные средства, вызывающие дисульфирамоподобную реакцию (ощущение жара, покраснение кожи, рвота, тахикардия) при совместном приеме с алкоголем: дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксифен, хлорамфеникол, хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид и другие гипогликемические препараты, гризофульвин, метронидазол, орнидазол, тинидазол, кетоконазол, прокарбазин; лекарственные средства, угнетающие функции центральной нервной системы.

### СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

#### Влияние пищи и напитков

Вы можете принимать капли Иммунал независимо от приема пищи.

#### Беременность и кормление грудью

В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта применение лекарственного средства в период беременности и лактации не рекомендуется. Данные о влиянии лекарственного средства на fertильность отсутствуют.

#### Вождение автотранспорта и управление механизмами

Данные о негативном влиянии эхинацеи на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами отсутствуют. При вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, следует принимать во внимание содержание в препарате этилового спирта (см. раздел «Информация о некоторых компонентах Иммунала»).

#### Информация о некоторых компонентах Иммунала

Препарат содержит этанол 20% (% об.) и сorbitол. Разовая доза для взрослых и детей старше 12 лет содержит до 404 мг этанола (этилового спирта), что эквивалентно 10 мл пива или 4,2 мл вина. Содержание этилового спирта необходимо принимать во внимание при назначении лекарственного средства детям старше 12 лет, пациентам с заболеваниями печени, алкоголизмом, эпилепсией, черепно-мозговой травмой и другими заболеваниями головного мозга со снижением судорожного порога.

Лекарственное средство в связи с содержанием сorbitола не следует назначать пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости фруктозы.

#### Передозировка

Случаи передозировки эхинацеей пурпурной не описаны.

Если после передозировки отмечаются нежелательные эффекты, обратитесь к врачу.

#### Если вы забыли принять капли Иммунал

Если вы забыли принять капли Иммунал, примите их при первой же возможности. Затем продолжайте лечение согласно прежней схеме. Не принимайте двойную дозу для восполнения пропущенной.

#### ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Как и все лекарства, капли Иммунал могут вызывать нежелательные эффекты, хотя развиваются они не у каждого.

Частота побочных эффектов неизвестна. В отдельных случаях может возникать реакция гиперчувствительности, проявляющаяся в виде кожной сыпи, зуда, отека лица (редко), бронхоспазма (чувство сдавления в грудной клетке, хрипы и одышка), приступа астмы, синдрома Стивенса-Джонсона (болезненная кожная реакция в результате аллергической реакции), анафилактического шока. В таком случае немедленно прекратите прием лекарства и свяжитесь со своим врачом.

Связь с аутоиммунными заболеваниями (рассеянный склероз, диссеминированный энцефалит, узловатая эритема, иммунотромбоцитопения, синдром Эванса, синдром Шегрена с тубулярной почечной дисфункцией) не исключена.


Эхинацея может вызвать развитие аллергических реакций у пациентов с атопическими заболеваниями.

В случае возникновения побочных эффектов, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

**Хранить в недоступном для детей месте.**

Хранить при температуре не выше 25°C.



При хранении капель возможно помутнение раствора или образование осадка, состоящего из активных полисахаридов. Перед употреблением тщательно встряхните флакон.

Лекарственные препараты всегда храните в оригинальной упаковке и не используйте по истечении срока годности, отпечатанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Не выбрасывайте лекарственные средства в канализацию или с домашним мусором. Спрашивайте у своего фармацевта, как избавиться от лишних лекарств. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

### СРОК ГОДНОСТИ

2 года.

Срок годности указан на упаковке.

### УСЛОВИЯ ОТПУСКА

Без рецепта.

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Лек д.д., Веровшкова 57, Любляна, Словения