


**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
(информация для пациента)



**Брусники листья, порошок крупный 1,5 г в фильтр-пакетах №20 в пачке**  
**Vaccinii vitis-idaeae folia**

**Общая характеристика:**

кусочки кожистых листьев различной формы, проходящие сквозь сито (2000). На нижней стороне листа заметны темно-коричневые железки. Цвет от светло-зеленого до темно-зеленого. Запах отсутствует.

Брусники листья содержат фенологликозиды (арбутин, метиларбутин и др.), дубильные вещества и другие биологически активные вещества.

**Форма выпуска.** Порошок крупный.

**Фармакотерапевтическая группа.** Прочие средства, используемые для лечения урологических заболеваний. Код ATX GO4BX.

**Фармакологические свойства.** Средство растительного происхождения. Водное извлечение (чай) брусники листьев обладает диуретическим и уроантисептическим действием.

**Показания к применению.** Внутрь: в комплексной терапии для симптоматического лечения нетяжелых заболеваний мочевыводящих путей (цистит, уретрит) после консультации врача.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Способ применения и дозы.** 1 фильтр-пакет помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипящей воды, закрывают крышкой и настаивают 15 мин.

Взрослые принимают внутрь в теплом виде по 1/2 стакана, дети старше 12 лет – от 1 столовой ложки до 1/3 стакана 2-3 раза в день через 30-40 минут после еды.

Перед употреблением водное извлечение (чай) рекомендуется взбалтывать. Приготовленное водное извлечение (чай) использовать свежеприготовленным.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

**Побочное действие.** Аллергические реакции, тошнота, рвота. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием водного извлечения и обратиться к врачу.

**Противопоказания.** Повышенная индивидуальная чувствительность к веществам, содержащимся в лекарственном средстве; заболевания, при которых

необходимо ограничение приема жидкости (гломерулонефрит, почечная недостаточность, тяжелые заболевания сердца); беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

**Применение в период беременности или кормления грудью.** Лекарственное средство противопоказано в период беременности. В связи с отсутствием данных прием во время лактации не рекомендован.

**Применение у детей.** Лекарственное средство не рекомендовано для применения у детей до 12 лет в связи с отсутствием достаточных данных.

**Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами.** Исследования не проводились.

**Передозировка.** При длительном применении возможна интоксикация гидрохиноном. Прием высоких доз может вызвать тошноту и рвоту. При длительном применении возможно обострение воспалительного процесса в почках и мочевыводящих путях, нарушение функции печени. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

**Меры предосторожности.** Не рекомендовано назначать пациентам с кислой реакцией мочи. Во время приема лекарственного средства необходимо обеспечить адекватный прием жидкости.

Если во время лечения симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, появляются расстройства мочеиспускания, боли спастического характера, кровь в моче), необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Не следует назначать одновременно с лекарственными средствами, которые вызывают подкисление мочи (метионин, аммония хлорид и др.). В связи с риском развития кровотечений не рекомендован одновременный прием варфарина. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

**Условия и сроки хранения.** Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре 15<sup>0</sup>C–25<sup>0</sup>C. Водное извлечение (чай) использовать свежеприготовленным.

**Срок годности:** 2,5 года.

**Условия отпуска.** Отпускают без рецепта.

**Упаковка.** По 1,5 г в фильтр-пакете №20 в пачке картонной. В пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.



**Производитель.** ООО «НПК Биотест».

**Адрес.** Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.  
Тел. 8(0152) 94-17-72.

