


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

(информация для пациента)

по медицинскому применению лекарственного средства

Йод

Торговое название: Йод.

Международное непатентованное наименование: Iodine.

Форма выпуска: раствор спиртовой для наружного применения 50 мг/мл.

Описание: прозрачная красно-бурового цвета жидкость с характерным запахом.

Состав: одна ампула содержит: *действующего вещества:* йода – 50 мг, *вспомогательные вещества:* калия йодид, спирт этиловый, вода очищенная.

Фармакотерапевтическая группа: Антисептические и дезинфицирующие средства.

Код ATX: D08AG03.

Показания к применению

Раствор йода используется наружно как антисептическое средство при инфекционно-воспалительных заболеваниях кожи, для обработки краев ран, небольших повреждений кожи (ссадин, порезов, микротравм).

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость (в т. ч. гиперчувствительность в анамнезе).

Гипертиреоз, аденома щитовидной железы, почечная недостаточность.

Не допускается обработка кожи при фурункулезе, угревой сыпи, геморрагическом диатезе, крапивнице, диабетических трофических язвах.

Герпетiformный дерматит Дюринга.

Период новорожденности.

Способ применения и дозы

Применяется наружно. Раствором йода смачивают ватный тампон, который используют для обработки пораженных участков кожи, при наличии ран смазывают кожу у краев ран, не нанося на раневую поверхность.

Побочные реакции

Раздражение кожи, аллергические реакции, включая ангионевротический отек, крапивницу, контактный дерматит, при длительном применении на обширных раневых поверхностях – «йодизм» (слезотечение, гиперсаливация, ринорея, бронхорея, отек слизистых оболочек).

Передозировка


При передозировке возможны явления йодизма, раздражения и ожоги.


При вдыхании концентрированных паров – поражение верхних дыхательных путей (ожог, ларинго- и бронхоспазм); при попадании концентрированных растворов внутрь – тяжелые ожоги пищеварительного тракта; в случае приема внутрь – развитие гемолиза, гемоглобинурии; летальная доза составляет около 3 г.

Лечение: промывание желудка 0,5 % раствором натрия тиосульфата, внутривенное введение раствора натрия тиосульфата 30 % – до 300 мл. При тяжелой кожной реакции на йод – лекарственное средство должно быть немедленно удалено 70 % спиртом этиловым. Также рекомендуется промыть кожу большим количеством воды в течение 15 минут. При случайном проглатывании, если пациент в сознании – молоко внутрь каждые 15 минут.

Особые указания и меры предосторожности

Не следует допускать попадания неразведенного лекарственного средства на слизистые оболочки рта, глаз, влагалища и прямой кишки.





Не рекомендуется использовать при глубоких или колотых ранах, серьезных ожогах, так как использование препарата может вызвать избыточное поглощение йода и раздражение тканей.

Не использовать лекарственное средство в течение более десяти дней!

Не рекомендуется обрабатывать обширные участки кожи.

Применение лекарственного средства может влиять на результаты исследований функции щитовидной железы.

Беременность и кормление грудью

Рекомендуется избегать применения препарата в период беременности и кормления грудью из-за возможного риска развития нарушений функции щитовидной железы у плода/ребенка.

Дети

Применение детям в период новорожденности противопоказано.

Не рекомендуется применение лекарственного средства у детей в возрасте до 5 лет из-за высокой вероятности системной абсорбции йода.

Влияние на способность управлять автотранспортом и механизмами

При использовании согласно инструкции по медицинскому применению, препарат не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять автотранспортом и механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При одновременном применении с препаратами для наружного применения, содержащими органические соединения, может наблюдаться денатурация белковых компонентов.

Фармацевтически несовместим с эфирными маслами, растворами аммиака, белой осадочной ртутью (образуется взрывчатая смесь).

Щелочная или кислая среда, присутствие жира, гноя, крови ослабляют антисептическую активность.

При сочетанном применении с желтой ртутной мазью возможно образование в слезной жидкости йодида ртути, обладающего прижигающим действием.



Упаковка

1 мл в ампулах из стекла. 10 ампул вместе с **ножом или скарификатором** для вскрытия ампул и листком-вкладышем помещают в коробку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Лекарственное средство не использовать после окончания срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Информация о производителе

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375 (177) 735612, 731156.