



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)
лекарственного средства
ЛИПЫ ЦВЕТКИ
(*TILIAE FLORES*)

Торговое название. Липы цветки.

Международное непатентованное название (МНН). Отсутствует.

Форма выпуска. Измельченное сырье.

Описание. Смесь цветков, цветоножек и кусочков прицветников различной формы, проходящие сквозь сито с номинальным размером отверстия 5600 мкм. Цвет лепестков беловато-желтый, чашелистиков – зеленовато- или желтовато-серый, прицветных листьев – светло-желтый или зеленовато-желтый. Запах слабый ароматный.

Состав. Липы цветки, 50 г.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие средства, применяемые при простудных заболеваниях.

Код АТХ. R05X.

Фармакологические свойства. Настой цветков липы оказывает потогонное, спазмолитическое, легкое седативное действие.

Показания к применению. В качестве симптоматического средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний. Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозы. 3 г (1 столовая ложка) цветков помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (водяной бане) при частом помешивании 15 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Принимают внутрь в теплом виде 2-3 раза в день: взрослые и дети старше 12 лет – по ½ стакана, детям 4-12 лет – по 1/3 стакана. Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного

средства.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость веществ, содержащихся в лекарственном средстве.

Меры предосторожности. Если во время приема настоя симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, развиваются нарушения дыхания, появляется кашель с гнойной мокротой и др.), необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Информация отсутствует. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Передозировка. Информация о случаях передозировки отсутствует. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Применение в период беременности и лактации. Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных принимать во время беременности и лактации не рекомендуется.

Применение у детей. Применение у детей до 4 лет не рекомендуется из-за отсутствия достаточных данных. Перед применением лекарственного средства у детей старше 4 лет рекомендовано проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность к управлению автотранспортом и работе с механизмами. Не изучалось.

Условия хранения. Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °C до 25 °C.

Приготовленный настой – в прохладном месте (при температуре от 8 °C до 15 °C) не более 2 суток. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек. Без рецепта.

Срок годности. 2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке!

Упаковка. В пакеты бумажные по 50 г. По одному пакету бумажному вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Производитель. ЗАО «БелАсептика», Республика Беларусь, Минский район, деревня Цнянка, военный городок 137«А», административное здание ЗАО «БелАсептика», комната 7. Тел. (017) 500 33 11, тел./факс (017) 500 33 46.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Беларусь