



ИНСТРУКЦИЯ
(информация для пациентов)
по медицинскому применению лекарственного средства
ТАВАМИН

Торговое название: Тавамин.

Международное непатентованное название: -

Форма выпуска: капсулы.

Описание: капсулы твердые желатиновые белого цвета.

Состав на одну капсулу: каждая капсула содержит:

действующие вещества: L-валин – 34 мг, L-изолейцин – 26 мг, L-лейцин – 101 мг, таурин (тауфон) – 39 мг;

вспомогательные вещества: метилцеллюлоза, кальция стеарат.

Состав капсулы твердой желатиновой номер 0: желатин, титана диоксид (Е 171).

Фармакотерапевтическая группа: Аминокислоты и их производные.

Код АТС: А16АА.

Фармакологическое действие

Оказывает гепатопротекторное действие. Нормализует функцию печени и ферментную активность гепатоцитов.

Показания к применению

- токсическое поражение печени;
- цирроз печени (в составе комплексной терапии);
- гепатит (подострый, хронический) различной этиологии;
- печеночная энцефалопатия;
- алкогольная болезнь печени.

Способ применения и режим дозирования

Внутрь по 3-5 капсул 3 раза в день после еды. Курс лечения до 20 дней, продолжительность его определяет врач в зависимости от основного заболевания. Капсулы следует проглатывать целиком, запивая небольшим количеством воды. При необходимости повторное применение возможно с интервалом в 2 недели.

Опыт применения у детей ограничен, не следует применять у детей в возрасте до 2 лет.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (крапивница, кожный зуд), диспептические расстройства.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо обратиться к врачу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства. При генетических расстройствах обмена аминокислот: синдром мочи в виде кленового сиропа.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки лекарственным средством не сообщалось.

Меры предосторожности

Следует соблюдать осторожность при применении у лиц с низким артериальным давлением, низким уровнем холестерина в крови, низким уровнем тромбоцитов в крови, при применении таких лекарственных средств, как аспирин, индометацин и других подобных препаратов, при сахарном диабете с неустойчивым уровнем сахара в крови.

Применение у детей

Из-за недостаточного опыта применения не следует назначать детям в возрасте до 2-х лет.

Применение во время беременности и в период лактации. Не рекомендуется применять Тавамин во время беременности и в период лактации.

Влияние на способность к управлению автомобилем и потенциально опасными механизмами. Не влияет на способность к управлению автомобилем и потенциально опасными механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Данных по взаимодействию Тавамина и разветвленных аминокислот с другими лекарственными средствами не опубликовано. Взаимодействие таурина, который входит в состав лекарственного средства, возможно со следующими лекарственными средствами: антигиперлипидемическими; антиагрегантами и антикоагулянтами; сахароснижающими препаратами; средствами, снижающими артериальное давление – усиление эффекта.

Условия хранения

В защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка

По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке.

По одной, две, три или пять контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель:
РУП "Белмедпрепараты",
Республика Беларусь, 220007, г. Минск,
ул. Фабрициуса, 30, т./ф.: (+375 17) 220 37 16,
e-mail: medic@belmedpreparaty.com

