


ИНСТРУКЦИЯ
(информация для пациентов)
по применению лекарственного средства
ФИТОХОЛ ПЛЮС

Торговое название: Фитохол плюс

Международное непатентованное название: -



Описание:

Твердые желатиновые капсулы цилиндрической формы с полусферическими концами зеленого цвета.

Состав: 1 капсула содержит:

Активное вещество: артишока листьев экстракт сухой 5 % (соотношение лекарственного растительного сырья/ нативный экстракт: 10/1) – 100,0 мг или артишока листьев экстракт сухой (соотношение лекарственного растительного сырья/ нативный экстракт: 15-30/1) – 100,0 мг, а-токоферилакетат (в виде сухого витамина Е 50% CWS/S) – 30,0 мг, селен (в виде селенометионина, премикса 0,5 %) - 0,010 мг.

Вспомогательные вещества: мальтодекстрин, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный, целлюлоза микрокристаллическая.

Состав желатиновой капсулы №0:

Желатин, вода очищенная, титана диоксид Е 171, хинолиновый желтый Е 104, патентованный голубой V Е-131, апельсиновый желтый Е-110.

Форма выпуска: капсулы

Фармакотерапевтическая группа: средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей. Прочие средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей.

Показания к применению

Препарат применяют в комплексной терапии для облегчения симптомов функциональных нарушений пищеварения (таких как диспепсия, чувство тяжести в правом подреберье, метеоризм, тошнота).

Как вспомогательное средство в составе комплексной терапии:

- при хронических заболеваниях желчного пузыря и желчевыводящих путей (таких как дискинезии желчевыводящих путей, хронические некалькулезные холангиты и холециститы);
- для улучшения выделительной функции почек.

Способ применения и дозы

Внутрь взрослым - по 1 капсуле 3 раза в день до еды, запивая 0,5-1 стаканом воды.

Продолжительность курса лечения составляет 2-3 недели. При необходимости возможно проведение повторных курсов по согласованию с врачом.

Побочное действие

Возможно развитие следующих побочных реакций: диарея, боли в животе спастического характера, дискомфорт в животе, тошнота, изжога, аллергические реакции. Частота развития побочных реакций не известна.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- гиперчувствительность к цветению/пыльце артишока и других растений семейства Сложноцветных;

- желчнокаменная болезнь;
- стеноз желчных путей;
- острые заболевания печени, почек, желче- и мочевыводящих путей;
- обструкция желчевыводящих путей, холангит;
- эпизома желчного пузыря;
- тяжелая печеночная дисфункция;
- острый инфаркт миокарда;
- детский возраст до 18 лет.

Передозировка

Информация о случаях передозировки отсутствует.

Возможно усиление побочных эффектов.

Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Особые указания

С осторожностью следует применять при повышенном риске развития тромбоэмболии после перенесенного инфаркта миокарда, а также при гипопротромбинемии (на фоне дефицита витамина К – может усиливаться при дозе витамина Е более 400 мг).

Не рекомендуется назначать в течение длительного времени совместно с поливитаминными препаратами, т.к. возможно наступление передозировки жирорастворимого витамина Е.

При длительном применении препарата и/или необходимости назначения повторных курсов терапии рекомендуется периодически контролировать показатели свертываемости крови, а также уровень холестерина в крови.

Препарат не применяют при билиарной обструкции, тяжелой почечной недостаточности.

В случае возникновения диареи или боли в животе лечение препаратом следует приостановить и проконсультироваться с врачом.

Из-за отсутствия данных по безопасности и эффективности, применение препарата не рекомендуется в периоды беременности и кормления грудью.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Возможно взаимодействие с антикоагулянтами кумаринового типа.

При одновременном применении витамина Е с циклоспорином повышается абсорбция последнего.

Назначение витамина Е в высоких концентрациях может вызвать дефицит витамина А в организме.

Одновременное применение витамина Е в дозе более 400 мг/сут с антикоагулянтами (производными кумарина и индандиона) повышает риск развития гипопротромбинемии и кровотечений.

Применение во время беременности и лактации

В связи с отсутствием достаточных данных, прием препарата во время беременности и лактации не рекомендуется. Применение препарата при беременности возможно в случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

Условия хранения

В защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка

По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По 3 или по 6 контурных упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Отпуск из аптек

Без рецепта врача.

Производитель

Иностранные производственное унитарное предприятие «Мед-интерпласт»,
222603 Республика Беларусь, г. Несвиж, ул. Ленинская, 115, каб. 204.

