


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ по медицинскому применению лекарственного средства (информация для пациента)

Метилурацил



Торговое название: Метилурацил.

Международное непатентованное название: Methyluracil.

Форма выпуска: мазь для наружного применения 100 мг/г.

Описание: мазь желтоватого цвета, с характерным запахом ланолина.

Состав: одна туба (15 г мази) содержит: *действующего вещества* - метилурацила – 1,5 г; *вспомогательные вещества*: парафин мягкий белый, ланолин, воду очищенную.

Фармакотерапевтическая группа: различные средства, способствующие рубцеванию.

Код АТХ – D03AX.

Показания к применению

Дерматиты, плохо заживающие раны, ожоги (в репаративной стадии), эрозии и язвы кожи (в том числе после лучевой терапии), трещины кожи заднего прохода и молочных желез. Применяется также в качестве фотозащитного средства при фотодерматитах.

Способ применения и дозы

Наружно. Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2 раза в день. При эрозиях, язвах и ранах мазь наносят после предварительной обработки антисептиками. Длительность лечения определяется врачом с учётом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

Побочное действие

Кратковременное легкое жжение, аллергические реакции.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Противопоказания

Избыточность грануляций. Острые и хронические лейкозы, другие злокачественные заболевания системы органов кроветворения, повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

Передозировка

Редко – изменение состава периферической крови при длительном применении мази в больших дозах.

Меры предосторожности

С осторожностью использовать при кожных заболеваниях, сопровождающихся образованием избыточных разрастаний ткани: вегетирующей пузырчатке, вегетирующей пиодермии, verrucозной форме эпидермодисплазии и др. Лекарственное средство следует применять с осторожностью при острых воспалительных заболеваниях кожи и в период обострения хронических, на большие по площади участки кожи – при нарушениях обмена холестерина и тяжелых заболеваниях печени.

Если при применении лекарственного средства симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Беременность и лактация

Применение возможно, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Влияние на способность управлять автомобилем и работать с другими механизмами

Не влияет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Можно назначать с другими дерматотропными средствами. Одновременное местное применение глюкокортикоидов ослабляет эффект мази.

Упаковка

15 г в тубе алюминиевой. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Условия хранения

При температуре не выше 20 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3,5 года. Лекарственное средство нельзя использовать позже срока, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Информация о производителе

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375(177)735612,731156.