

13-12 20/162

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ ДЛЯ ПАЦИЕНТА ДЛЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА АКОНервин

Гомеопатическое лекарственное средство. Перед применением проконсультируйтесь с врачом, специализирующимся на гомеопатическом методе лечения.

Регистрационный номер

Наименование

АКОнервин

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от « 01 » 03. 2017 № 008

Лекарственная форма

Капли для приема внутрь

Описание

Желтоватый раствор с запахом этилового спирта.

Состав

В 1 г(1,05 мл) раствора содержится:

Зверобой продырявленный D3 0,01 г.

Готовое лекарственное средство содержит не менее 33%(об/об) этанола.

В 1 мл лекарственного средства АКОнервин содержится 35 капель.

Вспомогательные вещества: спирт этиловый 96%, вода очищенная.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие лекарственные средства. Гомеопатическое лекарственное средство.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

АКОнервин представляет собой гомеопатическое лекарственное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Фармакокинетика

Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

Область применения

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских)



показаний к применению. Применяется в комплексной терапии при гипостенической форме неврастении.

Способ применения и дозы

Взрослым по 10 капель 3 раза в день.

Лицам пожилого возраста по 8 капель 3 раза в день.

Детям от 3 до 6 лет по 2 капли 3 раза в день.

Детям от 6 до 12 лет по 4 капли 3 раза в день.

Дети с 12 до 18 лет по 6 капель 3 раза в день.

Раствор принимать за 0,5-1 час до еды. Перед приемом гомеопатическое средство следует развести в небольшом количестве воды (1 чайная ложка).

Длительность курса лечения

Продолжительность приема гомеопатического средства определяется врачом.

Если во время приема гомеопатического средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Применение у детей

Гомеопатическое средство АКОнервин не применять у детей до 3 лет, перед применением у детей старше 3 лет проконсультируйтесь с врачом.


Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам средства.

Средство не должно применяться пациентами с алкогольной зависимостью.

Меры предосторожности

Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача. Перед началом приема гомеопатического средства АКОнервин необходимо удостовериться в отсутствии других заболеваний, проявляющихся астенией и расстройствами нервной системы, требующих назначения иных специфических лекарственных средств. В разовой дозе гомеопатического средства (10 капель) содержится не более 98 мг спирта этилового, данное средство не следует принимать пациентам с заболеваниями печени, алкогольной зависимостью, эпилепсией, черепно-мозговой травмой и другими заболеваниями головного мозга со снижением судорожного порога, беременным и кормящим грудью женщинам, детям до 3 лет. В период лечения следует избегать интенсивного ультрафиолетового облучения. Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу. В начале лечения гомеопатическим средством возможно временное ухудшение симптомов заболевания. В случае ухудшения состояния прием гомеопатического средства следует прекратить и обратиться к врачу. Действие гомеопатического




средства может уменьшиться при курении или под влиянием других вредных привычек (например, употребление алкоголя).

Применение у детей

Гомеопатическое средство АКОнервин не применять у детей до 3 лет, перед применением у детей старше 3 лет проконсультируйтесь с врачом.

Беременность и период лактации

В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта гомеопатическое средство не следует принимать во время беременности и лактации.



Побочное действие

Возможно развитие реакций гиперчувствительности (аллергических реакций), желудочно-кишечных расстройств, повышенной утомляемости и беспокойства. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Исследования по оценке взаимодействия с другими лекарственными средствами не проведены. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом. Зверобой продырявленный, входящий в состав лекарственного средства, индуцирует активность CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 и Р-гликопротеина, в связи с чем с осторожностью следует применять лекарственные средства, метаболизм которых зависит от активности этих ферментов (например, амитриптилин, фексофенадин, бензодиазепины, метадон, симвастатин, дигоксин, финастерида). Противопоказано сопутствующее использование циклоспорина, таクロлимуса для системного применения, ампренавира, индинавира и других ингибиторов протеаз, иринотекана и варфарина. Снижение концентрации в плазме крови пероральных контрацептивов может привести к развитию межменструальных кровотечений и уменьшению контрацептивного эффекта. Женщины, использующие оральные контрацептивы, должны использовать дополнительные меры контрацепции.

Перед плановой хирургической операцией необходимо определить риск взаимодействия гомеопатического лекарственного средства с лекарственными средствами, используемыми для общей и/или местной анестезии.

Передозировка

Информация о случаях передозировки отсутствует. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.


Влияние на способность управлять автотранспортом и работать с механизмами

Лекарственное средство содержит этиловый спирт. Во время приема лекарственного средства не рекомендовано вождение автомобиля и работа с движущимися механизмами.

Упаковка

Первичная упаковка: Капли гомеопатические по 20 мл во флаконах темного стекла с навинчивающейся крышкой из пропилена, с капельницей из полиэтилена.

Вторичная упаковка: Каждый флакон помещают вместе с инструкцией по применению в картонную упаковку.



Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. После вскрытия флакона лекарственное средство следует использовать в течение 6 месяцев. Не принимать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптеки

Без рецепта.

Государственное предприятие «АКАДЕМФАРМ» (Республика Беларусь) по заказу СООО «АконитФарма».

Адрес: ул. академика В.Ф. Купревича, д.5, к.3, Минск, 220141, Республика Беларусь, тел/факс 8(017) 268-63-64.

