



ЛИСТОК – ВКЛАДЫШ по медицинскому применению лекарственного средства Прополис

Прочтите внимательно листок-вкладыш перед применением лекарственного средства.

Сохраните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться прочитать его заново.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

Лекарственная форма: настойка для наружного применения.

Описание лекарственной формы. Прозрачная жидкость от желто-коричневого до красно-коричневого цвета с характерным запахом прополиса. Допускается образование осадка.

Состав: спиртовое извлечение прополиса 1:10.

Содержит этилового спирта не менее 75 %.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие антисептические и дезинфицирующие средства.

Фармакологическое действие

Прополис (пчелиный клей) является продуктом жизнедеятельности пчел и представляет собой смесь воска, смол, эфирных масел и ряда других природных соединений, обладающих биологической активностью (флавоны, флаванолы, производные коричной кислоты и др.). Обладает противовоспалительным эффектом, усиливает регенерацию поврежденных тканей.

Показания к применению

- воспалительные процессы слизистой оболочки полости рта, десен (стоматит, гингивит, пародонтит), глотки (фарингит), миндалин (тонзиллит), уха (отит);
- микротравмы и другие поверхностные повреждения кожного покрова и слизистой оболочки.

Способ применения и дозы

Настойку прополиса применяют местно в виде аппликаций и полосканий, а также в форме ингаляций.

При поверхностных повреждениях и воспалительных процессах слизистой оболочки полости рта раствор, приготовленный путем разведения 15 мл (1 столовая ложка) настойки прополиса в 100 мл (1/2 стакана) теплой кипяченой воды, применяют для полоскания 4-5 раз в сутки в течение 3-4 дней.

При тонзиллите и фарингите настойкой прополиса смазывают слизистую оболочку глотки и миндалин 1-2 раза в сутки. При тонзиллите настойку прополиса можно применять для приготовления ингаляционного водного раствора в соотношении 1:20. Проводят по 1-2 ингаляции в день.

При наружном гнойном отите после очищения слухового прохода в ухо вводят тампон, пропитанный настойкой прополиса, на 1-2 минуты 2-3 раза в сутки или закапывают по 1-2 капли 3-4 раза в сутки.

При пародонтите настойку вводят на турунде в пародонтальные карманы на 5 минут.

Побочное действие

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, в том числе аллергический дерматит, гиперемия, сыпь, ларингоспазм, одышка, отек Квинке.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: зуд кожи, жжение, локальный отек, покраснение, сухость и трещины кожи.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: при применении в полости рта возможно чувство жжения, сухость во рту, тошнота.

При появлении вышеуказанных побочных реакций, а также других побочных реакций, не упомянутых в лицензии-вкладыше, необходимо прекратить прием препарата и обратиться к лечащему врачу.

Противопоказания

Прополис настойка противопоказана при известной аллергии на продукты пчеловодства, аспирин, при поллинозах, острой экземе, астме, а также при кровотечении из пораженных участков кожи или слизистой оболочки. Детский возраст до 18 лет.

Применение во время беременности и кормления грудью

Применение в период беременности и в период лактации не рекомендуется.

Передозировка

При наружном применении настойки прополиса, случаи передозировки не описаны.

При ошибочном приеме препарата внутрь возможны следующие симптомы: сильное чувство жжения, сухость в полости рта, боли в эпигастральной области, тошнота, рвота.

Лечение: промывание полости рта и желудка теплой кипяченой водой.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Не рекомендуется смешивать с антисептическими средствами или продуктами пчеловодства.

Меры предосторожности

В случае развития аллергических реакций лекарственное средство следует отменить, назначить соответствующую терапию.

После применения препарата в полости рта не рекомендуется употреблять пищу и напитки в течение 15-30 мин.

При применении препарата в ротовой полости пациентам, страдающим хроническим алкоголизмом, эпилепсией, заболеваниями печени, беременным женщинам и кормящим матерям необходимо принимать во внимание, что лекарственное средство содержит этанол (спирт этиловый).

Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами

Не рекомендуется применение лекарственного средства при управлении автомобилем и работе с движущимися механизмами.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.


Срок годности

2 года. Срок годности указан на упаковке.

Нельзя использовать лекарственное средство после даты, указанной на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.



Форма выпуска

По 25 мл, 30 мл, 35 мл и 50 мл во флаконы из полиэтилентерефталата, помещенные вместе с листком-вкладышем в пачки из картона.

Информация о производителе

ООО «Фармтехнология», 220024 г. Минск, ул. Корженевского, 22.

Тел./факс: (017) 309 44 88, e-mail: ft@ft.by; www.ft.by.

