


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ (информация для пациентов) по медицинскому применению лекарственного средства **Борная мазь**

Торговое название: Борная мазь.

Международное непатентованное название: отсутствует.

Лекарственная форма: мазь для наружного применения 50 мг/г.

Состав: одна туба (25 г) содержит: *действующего вещества* – кислоты борной – 1,25 г; *вспомогательное вещество* – парафин мягкий белый.

Описание: мазь белого или почти белого цвета, без запаха, однородной консистенции.

Фармакотерапевтическая группа: антисептические и дезинфицирующие средства. Препараты на основе борной кислоты.

Код ATX: D08AD.

Показания к применению

Педикулез, микробные поражения кожи и наружного слухового прохода, легкие формы стрептодермии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующему веществу или вспомогательному компоненту лекарственного средства, нарушение функции почек,

острые воспалительные заболевания кожи, беременность, период лактации, детский возраст.

Способ применения и дозы

Наружно. При педикулезе наносят однократно 10–25 г мази на волосистые участки головы, через 20–30 мин смывают теплой водой с применением моющих средств, тщательно вычесывают гребнем. При воспалительных заболеваниях наружного слухового прохода используют турунду с нанесенным на нее небольшим количеством мази. При опрелости и трещинах кожи мазь наносят по мере необходимости тонким слоем на поврежденные участки, количество нанесенной мази не должно превышать 10 г.

Побочное действие

Кожная сыпь.

При длительном применении на обширных пораженных участках возможны тошнота, головная боль, рвота, спутанность сознания, диарея, кожная сыпь, десквамация эпителия, олигурия, аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При одновременном применении с препаратами для наружного применения могут создаваться новые соединения с непредвиденным эффектом.

Меры предосторожности

Борную мазь не следует наносить на волосистые участки при острых воспалительных заболеваниях кожи. Следует избегать попадания мази в глаза (в случае попадания промыть глаза теплой водой).

Избегать нанесения на слизистые оболочки и на обширные поверхности тела.

Беременность и лактация. Наружное применение противопоказано для беременных и кормящих грудью женщин.

Применение у детей младше 18 лет противопоказано, так как может негативно влиять на fertильность в будущем.

Влияние на возможность управления транспортными средствами и работы с опасными приспособлениями и механизмами. Не влияет.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Передозировка

При длительном применении на больших пораженных **поверхностях** возможны проявления симптомов острого отравления - тошнота, рвота, диарея, нарушение кровообращения и угнетение центральной нервной системы, снижение температуры тела, эритематозная сыпь, шок, кома. При длительном применении возможны проявления симптомов хронической интоксикации - истощение, стоматит, экзема, местный отек тканей, нарушение менструального цикла, анемия, судороги, алопеция.

Лечение симптоматическое. Показаны – гемотрансфузия, гемо-и перitoneальный диализ.

Упаковка

25 г в тубе алюминиевой. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Лекарственное средство нельзя использовать позже срока, указанного на этикетке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Информация о производителе

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375(177) 735612, 731156.