

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от 22.08.14 № 223

Ноготков цветки, измельченное сырье 50 г или 40 г в пачке
Calendulae flos

Общая характеристика:

кусочки язычковых и трубчатых цветков, обверток, цветолож и цветоносов различной формы, проходящие сквозь сито (5600), красновато-оранжевого, оранжевого или желтого цвета с желтовато-коричневыми и серо-зелеными вкраплениями. Запах слабый.

Ноготков цветки содержат каротиноиды, флавоноиды, тритерпеновые сапонины, эфирное масло, смолы, дубильные вещества, слизистые вещества, органические кислоты и другие биологически активные вещества.

Международное непатентованное название. Отсутствует.

Форма выпуска. Измельченное сырье.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые для лечения заболеваний гортани и глотки. Антисептические средства.

Фармакологические свойства.

Лекарственное средство растительного происхождения. Настой ноготков цветков оказывает местное противовоспалительное и антисептическое действие.

Показания к применению. Применяется для полосканий в комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта (гингивит, стоматит, пародонтит) и глотки (тонзиллит), симптоматического лечения легких воспалительных процессов кожи и небольших поверхностных ран.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозы. 3 столовые ложки сырья помещают в эмалированную посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Применяют местно для полосканий полости рта и глотки по 1/2-1 стакану настоя (в теплом виде) 2-4 раза в день.

Способ применения настоя при заболеваниях кожи (орошения, примочки) зависит от особенностей заболевания и определяется врачом.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта. Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Применение во время беременности и кормления грудью. В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и лактации не рекомендовано.

Применение у детей. Лекарственное средство не рекомендовано для детей до 6 лет для наружного применения (при заболеваниях кожи), для детей до 12 лет – для местного применения (при воспалительных заболеваниях полости рта и глотки).

Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами. Исследования не проводились.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к лекарственному средству, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как, ромашка, арника, амброзия, пижма, полынь, астра, хризантема.

Детский возраст до 6 лет для наружного применения (при заболеваниях кожи). Детский возраст до 12 лет для местного применения (при воспалительных заболеваниях полости рта и глотки). Период беременности и кормления грудью.

Передозировка. Информация о случаях передозировки отсутствует.

Меры предосторожности. Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

В случае появления признаков инфицирования раны необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. В случае одновременного применения других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Условия и сроки хранения. Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре 15°C–25°C. Приготовленный настой при температуре от 8°C до 15°C – не более 2 суток.

Срок годности. 2 года.

Условия отпуска. Отпускают без рецепта.

Упаковка. По 50 г или 40 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. Предусмотрено вложение листка-вкладыша в пачку картонную.

Производитель. ООО «НПК Биотест».

Адрес. Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.

Тел. 8 (0152) 68-45-79.

Сайт: www.biotest.by

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь