

ЛИСТОК – ВКЛАДЫШ по медицинскому применению лекарственного средства ГЕПАРИН КОМБИ

Прочтите внимательно листок-вкладыш перед тем, как начать применение лекарственного средства. Сохраните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться прочитать его заново. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

Торговое название: Гепарин Комби

Международное непатентованное название: не имеет

Описание: однородный бесцветный или с желтоватым оттенком, прозрачный или почти прозрачный гель. Допускается наличие пузырьков воздуха

Лекарственная форма: гель для наружного применения

Состав: 1 г геля содержит: действующих веществ:

Гепарина натрия 300 МЕ или 500 МЕ;

Аллантоина 2,5 мг;

Декспантенола 2,5 мг.

Вспомогательные вещества: этиловый спирт 96 %, пропиленгликоль, карбомер, диметилсульфоксид, диэтаноламин, вода очищенная.

Фармакотерапевтическая группа: средства, применяемые при варикозном расширении вен

Код АТС: C05BA53

Фармакологические свойства

Комбинированное лекарственное средство с антитромботическим, противовоспалительным и улучшающим регенерацию тканей действием для наружного применения.

Показания к применению

- в комплексной терапии для симптоматического лечения заболеваний поверхностных вен нижних конечностей (варикозное расширение, тромбофлебит);
- симптоматическое лечение и уменьшение отека после тупой травмы.

Способ применения и дозировка

Наружно: столбик геля длиной около 5 см наносят на неповрежденную кожу тонким слоем, втирая легкими массирующими движениями снизу вверх, 1-3 раза в сутки.

В случае использования геля при тромбофлебитах массирование не рекомендуется.

Гель применяют ежедневно до исчезновения воспалительных явлений (в среднем от 3 до 10 дней). В случае если в течение 10 дней лечения не наступает отчетливого улучшения, необходимо обратиться к врачу.

Побочное действие

Возможны местные реакции повышенной чувствительности (особенно при длительном применении геля) в виде гиперемии кожи, кожной сыпи, эритемы и аллергические реакции: крапивница, очень редко – ангионевротический шок.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к компонентам геля;
- вторично инфицированные пораженные поверхности кожи;
- открытые раны (в т.ч. кровоточащая язва голени);
- повышенная склонность к кровотечениям и тромбоцитопения.

Применение при беременности и кормлении грудью

Во время беременности и при грудном вскармливании препарат следует применять в случаях, когда ожидаемая польза для женщины превышает возможный риск для плода и грудного ребенка.

Передозировка

В связи с малой системной абсорбцией передозировка маловероятна. До настоящего времени случаи передозировки при наружном применении гепарина не описаны.

При длительном применении на большие поверхности возможны геморрагические осложнения.

Лечение: отмена препарата. При необходимости применяют антагонист гепарина — протамин сульфат (1% раствор).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Противосвертывающее действие гепарина усиливается при одновременном применении антикоагулянтов, антиагрегантов и нестероидных противовоспалительных средств. Алкалоиды спорыньи, тироксин, тетрациклин, антигистаминные средства и никотин снижают действие гепарина.

Меры предосторожности

Гель не следует наносить на открытые раны, на слизистые оболочки. Не следует применять при наличии гнойных процессов.

Из-за ограниченного опыта применения у детей и по причине недостаточного количества данных исследований, применять данное лекарственное средство при лечении детей не следует.

Не имеется данных об отрицательном влиянии лекарственного средства на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности


2 года. Срок годности указан на упаковке.

Данное лекарственное средство нельзя использовать после даты, указанной на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Лекарственное средство отпускается без рецепта врача.

Упаковка



По 30 г и 50 г в тубах из комбинированного материала с бушонами или в тубах из полимерных материалов. Тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Производитель:

ООО «Фармтехнология», 220024 г. Минск, ул. Корженевского, 22.

Телефон/факс: (017) 309-44-88; E-mail: ft@ft.by.

Сайт: www.ft.by

