

**Листок-вкладыш – информация для потребителя
МЕКСИБЕЛ,
раствор для инфузий 2 мг/мл
Действующее вещество: метилэтилпиридинола сукцинат**

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат МЕКСИБЕЛ и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата МЕКСИБЕЛ
3. Применение препарата МЕКСИБЕЛ
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата МЕКСИБЕЛ
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что собой представляет препарат МЕКСИБЕЛ и для чего его применяют
МЕКСИБЕЛ является лекарственным препаратом, который применяют в составе комплексной терапии органических заболеваний нервной системы:

- острые нарушения мозгового кровообращения;
- черепно-мозговая травма, последствия черепно-мозговых травм;
- хроническая форма цереброваскулярного заболевания.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата МЕКСИБЕЛ

Не принимайте МЕКСИБЕЛ, если:

- у Вас есть гиперчувствительность к метилэтилпиридинола сукцинату или любому из компонентов препарата (см. раздел б);
- у Вас имеются тяжелые заболевания почек или печени;
- детский возраст до 18 лет;
- у Вас беременность или период грудного вскармливания.

Если что-либо из вышеперечисленного относится к Вам, сообщите лечащему врачу.


Особые указания и меры предосторожности

Пациентам с артериальным давлением более 180/100 мм.рт.ст., кризовым течением артериальной гипертензии требуется предварительная коррекция артериальной гипертензии и седативная терапия, а также контроль артериального давления во время проведения терапии.

В отдельных случаях, особенно у предрасположенных пациентов с бронхиальной астмой при повышенной чувствительности к сульфитам, возможно развитие тяжелых реакций гиперчувствительности.

Другие препараты и препарат МЕКСИБЕЛ

Пожалуйста, сообщите своему врачу или фармацевту, если Вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие лекарственные средства, включая препараты, полученные



без рецепта или препараты растительного происхождения.

Одновременное применение лекарственного средства Мексигел с другими лекарственными средствами требует предварительной консультации врача и наблюдения врача в процессе лечения.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

МЕКСИБЕЛ противопоказан для назначения женщинам во время беременности и кормления грудью

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

В связи с возможными нежелательными реакциями со стороны нервной системы (сонливость, нарушения координации) во время лечения не рекомендовано вождение автотранспорта и занятие другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

3. Применение препарата МЕКСИБЕЛ

Лекарственное средство МЕКСИБЕЛ вводится внутривенно, капельно со скоростью 40-60 капель в минуту под контролем врача.

Дозу препарата, которая Вам подходит, определит ваш лечащий врач.

Режим дозирования

Взрослые:

При *острых нарушениях мозгового кровообращения* в составе комплексной терапии Мексигел применяют в первые 10-14 дней – внутривенно капельно по 200-500 мг 2-4 раза в сутки, затем внутримышечно по 200-250 мг 2-3 раза в сутки в течение 2 недель.

При необходимости назначения внутримышечных инъекций используется лекарственный препарат в другой лекарственной форме (раствор для инъекций).

При *черепно-мозговой травме и последствиях черепно-мозговых травм* в составе комплексной терапии Мексигел применяют в течение 10-15 дней внутривенно капельно по 200-500 мг 2-4 раза в сутки.

При *хронической форме цереброваскулярного заболевания* в составе комплексной терапии Мексигел следует назначать внутривенно капельно в дозе 200-500 мг 1-2 раза в сутки на протяжении 14 дней. Затем внутримышечно по 100-250 мг/сутки на протяжении последующих 2 недель.

При необходимости назначения внутримышечных инъекций используется лекарственное средство в другой лекарственной форме (раствор для инъекций).

Дети

Данные о применении препарата являются недостаточными для предоставления рекомендаций по применению лекарственного средства у детей.

Способ применения

Препарат вводят внутривенно, капельно со скоростью 40-60 капель в минуту. Режим дозирования подбирается индивидуально, в зависимости от тяжести заболевания.

Максимальная суточная доза не должна превышать 1200 мг.


Лекарственный препарат применяют сразу после вскрытия бутылки/флакона. Бутылка/флакон с лекарственным препаратом предназначена/предназначен только для однократного применения. Остатки препарата необходимо уничтожить.

Передозировка

Симптомы: нарушение сна (бессонница, в некоторых случаях – сонливость); незначительное и кратковременное повышение артериального давления.

Лечение, как правило, не требуется, поскольку симптомы исчезают самостоятельно в течение суток. При необходимости показана симптоматическая терапия.

Если у Вас есть дополнительные вопросы по использованию данного препарата, проконсультируйтесь с вашим врачом или фармацевтом.



4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, МЕКСИБЕЛ может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Немедленно сообщите лечащему врачу, если Вы испытываете любой из перечисленных симптомов после применения этого препарата, так как симптомы могут ухудшаться:

тошнота, сухость слизистой оболочки рта, металлический привкус во рту, метеоризм, диарея, сонливость, нарушения сна (сонливость или нарушение засыпания), чувство тревоги, эмоциональная реактивность, головная боль, нарушения координации, повышение артериального давления, снижение артериального давления, аллергические реакции, включая кожные высыпания, крапивницу, отек Квинке, гиперемию, зуд кожи, возможны тяжелые реакции гиперчувствительности, бронхоспазм, повышенное потоотделение кожи подошв и ладоней, ощущение «разливающегося тепла» во всем теле, першение в горле, дискомфорт в грудной клетке, одышка, сердцебиение, тахикардия, тремор, гиперемия лица, ощущение неприятного запаха.

При длительном применении препарата возможны слабость, периферические отеки, изменения в месте введения.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас появились побочные эффекты, сообщите об этом Вашему лечащему врачу. Это также относится к любым побочным эффектам, которые не указаны в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении МЗ РБ», <http://www.rceth.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата МЕКСИБЕЛА

Храните препарат в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Храните препарат в недоступном для детей месте.

Храните препарат в оригинальной упаковке.

Срок годности – 3 года.

Не применяйте препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

Условия отпуска: по рецепту.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Действующим веществом препарата МЕКСИБЕЛ является метилэтилпиридинола сукцинат – 200 мг (на одну бутылку/флакон).

Вспомогательными веществами являются натрия хлорид, натрия гидроксида 1 М раствор, вода для инъекций.


Теоретическая осмоляльность – 318 мОсм/кг.

Внешний вид препарата МЕКСИБЕЛ и содержимое упаковки

МЕКСИБЕЛ, раствор для инфузий 2 мг/мл, представляет собой прозрачный бесцветный или желтоватый раствор.

По 100 мл в бутылке/флаконе вместе с листком-вкладышем в картонной пачке.

Упаковка для стационара: по 56 бутылок или 24 флакона вместе с листком-вкладышем в ящиках из гофрированного картона.



Держатель регистрационного удостоверения и производитель
РУП «Белмедпрепараты»,
Республика Беларусь, 220007, г. Минск,
ул. Фабрициуса, 30, тел./факс:(+375 17) 220 37 16,
e-mail: medic@belmedpreparaty.com

Листок-вкладыш пересмотрен: