


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ЛИСТОК - ВКЛАДЫШ (информация для пациента) по медицинскому применению лекарственного средства **НИФУРОКСАЗИД**

Торговое название: Нифуроксазид.

Международное непатентованное название: Nifuroxazole.

Форма выпуска: таблетки покрытые пленочной оболочкой 100 мг.

Описание: таблетки покрытые пленочной оболочкой желтого цвета, круглые с двояковыпуклой поверхностью.

Состав: одна таблетка содержит: *действующего вещества* – нифуроксазида - 100 мг; *вспомогательные вещества*: кремния диоксид коллоидный безводный, желатин, тальк, магния стеарат, картофельный крахмал, опадрай II (содержит: спирт поливиниловый, частично гидролизованный; макрогол 3350 (полиэтиленгликоль); тальк; титана диоксид Е 171; алюминиевый лак на основе желтого хинолинового Е 104; железа оксид желтый Е 172).

Фармакотерапевтическая группа: Прочие кишечные противомикробные средства.

Код АТХ: A07AX03.

Показания к применению

Лечение острой диареи бактериального происхождения при отсутствии признаков инвазии (например, ухудшения общего состояния, лихорадки, признаков токсикоинфекции). Сопутствующая регидратационная терапия определяется тяжестью диареи, возрастом, полу, массой тела пациента, а также наличием сопутствующих заболеваний.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Противопоказания

- детский возраст до 6 лет;
- реакции повышенной чувствительности к производным 5-нитрофурана;
- беременность.

Способ применения и дозы

Лекарственное средство предназначено для взрослых и детей старше 6 лет.

Принимать таблетки внутрь, не разжевывая, запивая $\frac{1}{2}$ стакана охлажденной кипяченой воды.

Взрослым: 800 мг в сутки (по 4 таблетки 2 раза в день; или по 2 таблетки 4 раза в день).

Детям от 6 лет: 600-800 мг в сутки (по 2 таблетки 3 раза в день; или по 2 таблетки 4 раза в день).

Для детей младше 6 лет следует применять другую лекарственную форму нифуроксазида.

Продолжительность приема нифуроксазида ограничена 7 днями.

Побочное действие

Обычно нифуроксазид переносится хорошо. Однако могут развиваться нижеуказанные побочные реакции:

Со стороны кроветворной и лимфатической систем: описан один случай гранулоцитопении.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: в случаях индивидуальной гиперчувствительности к нифуроксазиду могут появиться боль в животе, тошнота и обострение диареи.

В случае появления указанных симптомов незначительной интенсивности нет необходимости применения специальной терапии или отмены препарата. При значительной интенсивности данных симптомов следует прекратить прием препарата. В дальнейшем пациенту не следует принимать производные нитрофурана.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки. Возможны разрывы аллергических реакций (кожная сыпь, крапивница, отек Квине, анафилактические реакции). В случае развития реакций гиперчувствительности, таких как одышка, кожная сыпь, зуд, следует прекратить прием препарата.

Меры предосторожности

Во время лечения необходимо перорально или парентерально (в зависимости от состояния больного) восполнять потерю жидкости.

Употребление алкогольных напитков во время лечения нифуроксазидом может вызвать дисульфирамоподобную реакцию.

Нифуроксазид не назначают в качестве монотерапии для лечения кишечных инфекций, сопровождающихся септицемией. В случае инфекционной диареи с клиническими проявлениями генерализации инфекции необходимо назначать антибактериальные препараты системного действия.

Если в период лечения препаратом появляются симптомы обезвоживания, необходимо, в зависимости от клинического состояния пациента, проводить регидратационную терапию (взрослым - около 2 литров жидкости в сутки).

В случае продолжающейся диареи после 3 дней лечения необходимо провести углубленную диагностику, целью которой является определение причины симптомов, и рассмотреть вопрос начала антибиотикотерапии.

В случае появления реакций гиперчувствительности, таких как одышка, кожная сыпь, зуд, следует прекратить применение лекарственного средства.

Нифуроксазид следует применять с соблюдением строгой диеты, исключая из рациона питания соки, сырье фрукты и овощи, острую и трудноперевариваемую пищу.

Применение в период беременности или кормления грудью. Не рекомендуется применять препарат при беременности и в период лактации.

Влияние на способность управлять транспортом и работать с механизмами

Лекарственное средство не влияет на способность к управлению автомо-

билем и работу с другими механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При лечении Ниfurоксазидом следует избегать одновременного приема пероральных средств из-за сильных адсорбционных свойств лекарственного средства. Т.к. нифуроксазид не всасывается из ЖКТ, возможность взаимодействия с другими системными лекарственными средствами маловероятна.

Не рекомендуется прием препарата с лекарственными средствами, способными вызывать синдром отмены или антидепрессантами.

Передозировка

Симптомы передозировки препарата не описаны.

В случае передозировки рекомендуется промывание желудка и симптоматическое лечение.

Упаковка

10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. 3 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона (№10x3).

Условия хранения

В защищенном от света и влаги месте, при температуре от 15 °C до 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Лекарственное средство не использовать после окончания срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Информация о производителе

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375 (177)735612, 731156.