

Листок-вкладыш – информация для потребителя
ЛАКТОБАЦИЛЛИН, порошок лиофилизированный для приготовления
суспензии для приема внутрь 5 доз
Действующие вещества: бактерии штаммов *Lactobacillus acidophilus* 95/25 и
***Bacillus subtilis* S**

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат ЛАКТОБАЦИЛЛИН и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата ЛАКТОБАЦИЛЛИН.
3. Применение препарата ЛАКТОБАЦИЛЛИН.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата ЛАКТОБАЦИЛЛИН.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что собой представляет препарат ЛАКТОБАЦИЛЛИН и для чего его применяют

ЛАКТОБАЦИЛЛИН представляет собой комбинированный препарат, состоящий из живых клеток специально подобранных штаммов молочнокислых бактерий (*Lactobacillus acidophilus*) и бацилл (*Bacillus subtilis*), которые способствуют поддержанию и функционированию кишечной микрофлоры.

ЛАКТОБАЦИЛЛИН используется как вспомогательное средство для:

- симптоматического лечения диареи и в качестве дополнения к восполнению потери жидкости и/или диетическим мерам у взрослых;
- профилактики кишечной дисфункции после антибактериальной и лучевой терапии;
- восстановления микробиологического равновесия в кишечнике при острых и хронических воспалительных заболеваниях тонкой и толстой кишки, протекающих на фоне нарушений микрофлоры.

2. О чем следует знать перед применением препарата ЛАКТОБАЦИЛЛИН

Не принимайте ЛАКТОБАЦИЛЛИН, если:

- у Вас аллергия на любое действующее вещество препарата или молочные продукты, либо на какие-то компоненты препарата, указанные в разделе 6 листка-вкладыша;
- Вы беременны или кормите грудью.

ЛАКТОБАЦИЛЛИН не показан к применению у детей до 18 лет.

Если что-либо из вышеперечисленного относится к Вам, сообщите лечащему врачу и прекратите прием препарата ЛАКТОБАЦИЛЛИН.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата ЛАКТОБАЦИЛЛИН проконсультируйтесь с лечащим врачом при наличии следующих факторов риска:

- у Вас имеются нарушения иммунной системы;
- Вы больны СПИДом;
- Вам делали пересадку органов;
- Вы проходите курс химиотерапии;
- у Вас эндо- или миокардит;
- Вы перенесли операцию на толстой кишке, в ротовой полости или на зубах;
- у Вас нарушена функция поджелудочной железы (инсулинозависимый диабет);
- у Вас диарея с примесью крови.

ЛАКТОБАЦИЛЛИН способен повышать усвоение сахара, поэтому во время приема данного препарата следует постоянно контролировать уровень глюкозы в крови.

НЕМЕДЛЕННО прекратите лечение препаратом ЛАКТОБАЦИЛЛИН и обратитесь к врачу, если диарея не прекращается после 2-х дней лечения!

Во время лечения Вам необходимо:

- употреблять большое количество жидкости для компенсации потери жидкости, обусловленной диареей (ежедневное потребление воды для взрослого составляет в среднем 2 литра);
- полноценно питаться на протяжении сохранения симптомов диареи, исключая некоторые продукты питания (в частности, сырые овощи, фрукты, зелень, пряную пищу, охлажденную пищу и холодные напитки).

Другие препараты и препарат ЛАКТОБАЦИЛЛИН

Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать любые другие препараты. Это относится к любым растительным препаратам или препаратам, которые Вы купили без рецепта врача.

Во время лечения препаратом ЛАКТОБАЦИЛЛИН следует избегать употребления пищевых продуктов, обладающих антимикробной активностью (чеснок, лук).

ЛАКТОБАЦИЛЛИН может взаимодействовать с некоторыми антибактериальными лекарственными препаратами, перечисленными ниже:

- азитромицин,
- цефаклор,
- цефепим,
- норфлоксацин,
- ципрофлоксацин,
- колистин,
- полимиксин.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Безопасность и эффективность применения ЛАКТОБАЦИЛЛИНА во время беременности и в период грудного вскармливания не изучалась. Не следует принимать ЛАКТОБАЦИЛЛИН во время беременности и в период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

ЛАКТОБАЦИЛЛИН не влияет на способность к управлению автотранспортом и

другими потенциально опасными механизмами.

3. Применение препарата ЛАКТОБАЦИЛЛИН

Всегда принимайте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Режим дозирования

Взрослым рекомендуется принимать по 5 доз (1 флакон) 3 раза в день.

Продолжительность курса лечения лекарственным препаратом составляет 12 дней.

При необходимости, только по рекомендации врача, разовая доза может быть увеличена до 10 доз (2 флакона), длительность лечения – до 21 дня.

Применение у детей. Препарат противопоказан детям до 18 лет (отсутствуют данные об изучении безопасности и эффективности применения ЛАКТОБАЦИЛЛИНА у детей и подростков).

Способ применения

ЛАКТОБАЦИЛЛИН предназначен для приема внутрь в виде раствора.

Раствор ЛАКТОБАЦИЛЛИНА следует принимать за 30 минут до еды или между приемами пищи.

Рекомендации по приготовлению раствора:

Перед применением флаконы вскрывают и их содержимое растворяют кипяченой водой комнатной температуры из расчета 1 чайная ложка воды на 1 флакон. Лекарственный препарат растворяется в течение 5 минут с образованием гомогенной взвеси кремового цвета со специфическим запахом. Затем содержимое переносят в стакан с водой, перемешивают и выпивают.

Растворенный препарат хранению не подлежит, поэтому раствор необходимо выпить сразу после приготовления.

Если Вы применили препарата ЛАКТОБАЦИЛЛИН больше, чем следовало

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Если Вы считаете, что получили слишком большую дозу препарата ЛАКТОБАЦИЛЛИН, немедленно обратитесь к врачу.

Если Вы забыли принять препарат ЛАКТОБАЦИЛЛИН

Если Вы забыли принять дозу, примите ее как можно быстрее. Если подошло время для приема следующей дозы лекарства, пропущенную дозу принимать не нужно. Не принимайте двойную дозу, чтобы восполнить забытую. Если Вы пропустили несколько приемов, сообщите об этом врачу.


4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, ЛАКТОБАЦИЛЛИН может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Немедленно прекратите применение препарата ЛАКТОБАЦИЛЛИН и обратитесь к врачу, если у Вас наблюдаются аллергические реакции, такие как сыпь на коже.

При применении препарата ЛАКТОБАЦИЛЛИН редко (менее чем у 1 из 1000 человек) могут возникать следующие нежелательные реакции:

- озноб,
- сыпь на коже,
- боли в животе,
- диарея.



При уменьшении дозы либо отмене препарата эти явления полностью купируются в течение суток.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас появились нежелательные реакции, сообщите об этом своему лечащему врачу. Это также относится к любым нежелательным реакциям, которые не указаны в данном листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», <http://www.rceth.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата ЛАКТОБАЦИЛЛИН

Храните препарат в недоступном для детей месте.

Храните препарат в защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 8 °С.

Храните препарат в оригинальной упаковке.

Срок годности – 2 года.

Не применяйте препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не применяйте препарат, если Вы заметили, что флакон, в котором находится порошок, поврежден.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Состав на одну дозу: лиофилизированных в среде культивирования жизнеспособных бактерий штамма *Lactobacillus acidophilus* 95/25 – не менее 10⁸ КОЕ, лиофилизированных в среде культивирования жизнеспособных бактерий штамма *Bacillus subtilis* S – не менее 10⁷ КОЕ.

Среда культивирования состоит из молока сухого обезжиренного, сахарозы, кукурузного экстракта, калия дигидрофосфата, калия гидрофосфата, воды очищенной.

Внешний вид препарата ЛАКТОБАЦИЛЛИН и содержимое упаковки

ЛАКТОБАЦИЛЛИН представляет собой порошок или пористую массу светло-бежевого или светло-бежевого с желтоватым оттенком цвета и с характерным запахом.

Упаковка

По 5 доз во флаконы. 6 флаконов вместе с листком-вкладышем помещают в пачку.

Упаковка для стационаров: 40 флаконов вместе с листком-вкладышем помещают в групповую коробку.

Условия отпуска: без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30,

тел./факс: (+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: