


ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)



**Боярышника плоды,
порошок крупный 3 г в фильтр-пакетах №20 в пачке
*Crataegi fructus***

Общая характеристика:

смесь кусочков мякоти плода и деревянистых косточек, проходящая сквозь сито (2000). Цвет кусочков от желто-оранжевого и темно-красного до коричневатого-красного, коричневого или черного, иногда с беловатым налетом выкристаллизовавшегося сахара. Запах отсутствует.

Боярышника плоды содержат флавоноиды (кверцетин, гиперозид, витексин), органические кислоты (лимонная, олеановая, урсоловая, кратегусовая, кофейная, хлорогеновая), каротиноиды, дубильные вещества, жирные масла, пектины, тритерпеновые и флавоновые гликозиды, сахара, витамины и другие биологически активные вещества.

Форма выпуска. Порошок крупный.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие лекарственные средства, применяемые при заболеваниях сердца.

Фармакологические свойства. Оказывает умеренное кардиотоническое, гипотензивное, спазмолитическое и седативное действие, способствует улучшению коронарного кровотока.

Показания к применению. В комплексной терапии функциональных нарушений сердечной деятельности.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозы. 1 фильтр-пакет помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 150 мл (3/4 стакана) кипящей воды, закрывают крышкой и настаивают 15 мин. Фильтр-пакет отжимают.

Водное извлечение (чай) принимают внутрь по 150 мл 2 раза в день за 30 минут до еды.

Перед употреблением водное извлечение рекомендуется взбалтывать. Водное извлечение использовать свежеприготовленным.

Кратность приема и длительность курса лечения определяются врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Противопоказания. Гиперчувствительность к активным веществам лекарственного средства, выраженная артериальная гипотензия, брадикардия.

Применение во время беременности и кормления грудью. Не рекомендуется во время беременности и в период лактации из-за отсутствия адекватных данных.

Применение у детей. Применение у детей до 18 лет не рекомендовано в связи с отсутствием достаточных данных.


Побочное действие. Возможны аллергические реакции. При длительном применении или применении в больших дозах возможны сонливость, артериальная гипотензия, брадикардия. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка. Симптомы: снижение артериального давления, головокружение, сонливость, брадикардия. В случае передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Меры предосторожности. Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача для точной диагностики заболевания. Во время лечения необходим контроль артериального давления и ЭКГ-мониторирование. Если во время лечения симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, развиваются отеки нижних конечностей, необходимо обратиться к врачу. Необходима немедленная медицинская помощь при возникновении боли в области сердца с иррадиацией в руку, верхнюю часть живота, шею, или в случае развития дыхательной недостаточности.

Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами. В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. При совместном назначении с сердечными гликозидами происходит усиление кардиотонического, с β -адреноблокаторами — гипотензивного действия. Не рекомендуется одновременное применение с антиаритмическими средствами III класса, а также с цизапридом. Прием с солями алкалоидов не рекомендуется в связи с возможностью образования комплексов. В случае одновременного применения других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.



Условия и сроки хранения. Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре 15°С–25°С. Водное извлечение (чай) использовать свежеприготовленным.

Срок годности. 3 года.

Условия отпуска. Отпускают без рецепта.

Упаковка. По 3 г в фильтр-пакетах №20 в пакете бумажном с последующим вложением в пачку картонную. В пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.

Производитель. ООО «НПК Биотест».

Адрес. Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.

Тел. 8 (0152) 68-45-79.

Сайт: www.biotest.by

