

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
по медицинскому применению лекарственного средства
Бензилбензоат ФТ

Прочитайте внимательно листок-вкладыш перед началом применения лекарственного средства. Данное лекарственное средство отпускается без рецепта. Для достижения оптимальных результатов его следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в листке-вкладыше. Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочитать его заново. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.

Международное непатентованное название: Benzyl benzoate.

Форма выпуска: эмульсия для наружного применения 200 мг/г.

Описание лекарственной формы: эмульсия белого цвета со слабым специфическим запахом, пенящаяся при взбалтывании. Допускается расслоение эмульсии, которое устраняется при взбалтывании.

Состав: 1 г эмульсии содержит в качестве действующего вещества 200 мг бензилбензоата.

Вспомогательные вещества: макрогола цетостеариловый эфир, мыло туалетное твердое, шампунь, вода очищенная.

Фармакотерапевтическая группа: средства для унифицированного применения против чесоточного клеща.

Код АТС: P03AX01.

Фармакологические свойства

Противопаразитарный препарат для наружного применения. Токсически действует на разные виды клещей, в том числе на чесоточных клещей. Проникает через хитиновый покров и накапливается в организме эктопаразитов в токсических концентрациях, вызывая гибель их личинок и взрослых особей; не действует на яйца эктопаразитов. Гибель чесоточных клещей наступает через 7-32 минуты.

Проникает в верхние слои эпидермиса кожи, в системный кровоток не всасывается.


Показания к применению

- Чесотка.


Способ применения и дозы

Курс лечения продолжается 4 дня. В первый день обработку проводят вечером перед сном после тщательного мытья под душем теплой водой с мылом. Эмульсию втирают в кожу рук, затем туловища и ног, включая подошвы и пальцы. После обработки кожи следует использовать только чистое белье и одежду. На 2-ой и 3-ий дни делают перерыв в лечении, при этом остатки эмульсии не смывают с кожи.

На 4-й день вечером пациент моется с мылом и проводит втирание эмульсии, как в первый день, используя оставшуюся эмульсию, и еще раз меняет все белье. Руки после обработки не следует мыть в течение 3 ч, в последующем руки обрабатывают эмульсией после каждого мытья. В случае смывания эмульсии с других участков кожи их нужно также повторно обработать. Эмульсию полностью смывают с кожи на пятый день лечения.



Взрослым назначают эмульсию в концентрации 200 мг/г, детям до 5 лет – 100 мг/г, для чего эмульсию в концентрации 200 мг/г перед употреблением разводят кипяченой водой 1:1.



Побочное действие

Местные реакции: возможны (особенно у детей) ощущение жжения, раздражение кожи.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше по применению лекарственного средства. Вы можете сообщить о нежелательных реакциях непосредственно в информационную базу данных по нежелательным реакциям на лекарственные средства; также Вы можете сообщить о неэффективности лекарственного средства. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности лекарственного средства.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
- Гнойничковые заболевания и повреждения кожи.
- Беременность, период грудного вскармливания.
- Не рекомендуется использование детям до 3-х лет.

Применение в период беременности и грудного вскармливания

В период беременности применение лекарственного средства противопоказано; при необходимости применить лекарственное средство в период лактации следует на время лечения кормление приостановить.

Передозировка

При использовании эмульсии по назначению случаи передозировки не известны.

При случайном проглатывании или использовании очень большого количества эмульсии возможны: усиление нежелательных реакций, появление признаков возбуждения центральной нервной системы (судороги), внезапная потеря сознания, задержка мочи.

Лечение: немедленно обратиться к врачу, симптоматическая терапия. При случайном проглатывании может быть целесообразным промывание желудка (если это возможно в течение нескольких часов после проглатывания) и применение активированного угля.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Нежелательно одновременное назначение с другими лекарственными средствами для наружного применения.

Особые указания

Лечение пациентов, выявленных в одном очаге, а также контактных лиц, должно проводиться одновременно во избежание заражения. Пиодермии, экземы (осложнения) следует лечить одновременно с чесоткой и продолжать после ее ликвидации.

Сохранение зуда в течение нескольких дней после полноценного курса лечения не является показателем его неэффективности и не является показанием для назначения дополнительного курса специфической терапии. Зуд является реакцией организма на убитого клеща и продукты его жизнедеятельности и исчезает при назначении антигистаминных лекарственных средств и мазей с глюкокортикоидами.

После лечения необходим врачебный контроль в течение 2 недель, а при наличии осложнений – и более длительное время.

Следует проводить смену белья и постельных принадлежностей.

Срок годности 36 мес.
Состав: 100 г лекарственного средства, 100 г вспомогательных веществ.

Все предметы, которые соприкасались с зараженной кожей, должны быть подвергнуты тщательной обработке. Постельные принадлежности и нижнее белье, полотенца, верхнюю одежду следует стирать при температуре, по меньшей мере, 60 °C. Верхнюю одежду можно также прогладить с обеих сторон горячим утюгом. Если предметы или одежду можно стирать только при более низких температурах или вообще нельзя подвергать стирке (например, обувь, игрушки), следует положить их на 7 дней в закрытые полиэтиленовые пакеты или вывесить на открытый воздух на 3 дня. Ковры, матрасы, мягкую мебель следует тщательно пропылесосить, обработать средствами для дезинфекции или подвергнуть камерной дезинфекции. В квартире необходимо провести уборку, мытье полов с моющими средствами или с добавлением дезинфицирующих средств.

Рекомендуется во время лечения избегать интенсивного воздействия солнечного света. Необходимо избегать попадания лекарственного средства в глаза, нос, рот.

При попадании лекарственного средства:

- в рот: рот прополоскать обильно водой или 2% теплым раствором питьевой соды;
- в нос: обильно промыть водой;
- в глаза: тщательно промыть водой или 1% раствором гидрокарбоната, при раздражении слизистой оболочки глаз закапывать 30% раствор альбуцида натрия.

В случае проглатывания и попадания лекарственного средства в желудок, а также появления каких-либо нежелательных реакций следует немедленно обратиться к врачу.

Применение у лиц с нарушением функции печени и почек не изучено.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Не влияет на способность управлять транспортными средствами и выполнять работы, требующие повышенной концентрации внимания.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года. Срок годности указан на упаковке.

Данное лекарственное средство нельзя использовать после даты, указанной на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Упаковка

По 100 г и 150 г в пластмассовых флаконах, укупоренных колпачками полимерными винтовыми. Каждый флакон вместе с листком-вкладышем для потребителей помещен в пачку из картона.

Информация о производителе

ООО «Фармтехнология», 220024, г. Минск, ул. Корженевского, 22.

Телефон/факс: (017) 309 44 88. E-mail: ft@ft.by.