


**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
(информация для пациента)



**Девясила корневища и корни, измельченное сырье 100 г в пачке**  
**Inulae helenii rhizomata et radices**

Общая характеристика:

кусочки корневищ и корней различной формы, проходящие сквозь сито (5600). Цвет серовато-коричневый, на изломе — желтовато-белый или желтовато-серый. Запах ароматный.

Девясила корневища и корни содержат алантовое эфирное масло (3 %), липиды (1,8 %, в их составе присутствуют кислоты — миристиновая, пальмитиновая, стеариновая, олеиновая), инулин (до 45 %), сапонины (фриделин, даммаран, даммарациол и др.), стероиды (стигмастерин и ситостерины).

**Форма выпуска.** Измельченное сырье.

**Фармакотерапевтическая группа.** Отхаркивающие средства.

**Фармакологические свойства.**

Оказывает отхаркивающее (способствует отхождению мокроты) и противовоспалительное действие.

**Показания к применению.** В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Способ применения и дозы.** 16 г (2 столовые ложки) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде (водяной бане) 30 мин. Охлаждают при комнатной температуре 10 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь по 50-100 мл (1/4-1/2 стакана) 2-3 раза в день за 1 час до еды в теплом виде.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать.

**Побочное действие.** Возможно возникновение аллергических реакций, изжоги, болей в животе. Лекарственное средство оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки и повышает их чувствительность.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Передозировка.** Передозировка лекарственного средства приводит к развитию рвоты, диареи, болей спастического характера и паралича кишечника. В случае возникновения симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Для облегчения симптомов передозировки необходимо провести промывание желудка и принять активированный уголь.

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность к лекарственному средству, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как, арника, ромашка, амброзия, пижма, полынь, астра, хризантема. Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы и/или почек. Беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

**Применение во время беременности и кормления грудью.** Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных принимать во время беременности и лактации противопоказано.


**Применение у детей.** В связи с отсутствием данных по безопасности и эффективности, применение лекарственного средства у детей до 12 лет противопоказано. Применение у детей старше 12 лет возможно только после консультации врача.

**Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами.** Не изучалось.

**Меры предосторожности.** Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, развиваются нарушения дыхания, появляется кашель с гнойной мокротой и др.), необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Отвар обладает горьким вкусом.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Не изучалось.

**Условия и сроки хранения.** Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте, при температуре 15°C–25°C. Приготовленный отвар при температуре от 8°C до 15°C – не более 2 суток.



**Срок годности.** 3 года.

**Условия отпуска.** Отпускают без рецепта.

**Упаковка.** По 100 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. В каждую пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.

**Производитель.** ООО «НПК Биотест».

**Адрес.** Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.

Тел. 8 (0152) 68-45-79.

Сайт: [www.biotest.by](http://www.biotest.by)

