


Министерство здравоохранения Республики Беларусь

**Листок-вкладыш**

по медицинскому применению лекарственного средства  
(информация для пациента)

**КРАПИВЫ ЛИСТЯ**  
**URTICAE FOLIUM**



**МНН.** Отсутствует.

**Регистрационный номер** \_\_\_\_\_

**Общая характеристика.** Крапивы листья содержат каротиноиды, аскорбиновую кислоту, витамины группы В, К, флавоноиды, дубильные вещества, хлорофилл, соли железа, кремния и другие биологически активные вещества.

**Состав.** Крапивы листья, порошок крупный.

**Форма выпуска.** Порошок крупный 1,5 г в фильтр-пакетах №20 в пачке.

**Описание.** Кусочки листьев различной формы, проходящие сквозь сито (2000). При рассмотрении под лупой видны фрагменты листовой пластинки, реже – кусочки черешков. Поверхность листовой пластинки шершавоволосистая, покрытая многочисленными волосками беловато-серого цвета, особенно вдоль жилок с нижней стороны листа. Цвет темно-зеленый со светло-зелеными и белыми вкраплениями. Запах слабый.

**Фармакотерапевтическая группа.** Прочие диуретические средства.

**Фармакологические свойства.** Средство растительного происхождения. Оказывает противовоспалительное и диуретическое действие, повышает тонус матки.

**Показания к применению.**

*Внутрь:* в качестве мочегонного средства в комплексной терапии легких воспалительных заболеваний мочевыводящих путей; в качестве симптоматического средства в комплексной терапии нетяжелых болей в суставах.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Способ применения и дозировка.** 2 фильтр-пакета помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипящей воды, закрывают крышкой и настаивают 15 мин. Фильтр-пакеты отжимают.

Принимают внутрь по 1/2 стакана водного извлечения (чая) 3-4 раза в день до еды.

Перед употреблением водное извлечение (чай) рекомендуется взбалтывать. Водное извлечение (чай) использовать свежеприготовленным.

Кратность приема и длительность курса лечения определяются врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

**Побочное действие.** Возможны аллергические реакции (зуд, кожная сыпь, крапивница), умеренные желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея), гиперкоагуляция. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность. Заболевания, при которых необходимо ограничение приема жидкости (например, заболевания почек или тяжелые заболевания сердца). Беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет. Применение лекарственного средства не рекомендовано пациентам с повышенной свертываемостью крови, кровотечениями.

**Передозировка.** Информация о случаях передозировки отсутствует. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

**Применение у детей.** Применение у детей до 12 лет не рекомендовано в связи с отсутствием достаточных данных.

**СОГЛАСОВАНО**  
Министерством здравоохранения  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

**Применение во время беременности и кормления грудью.** Безопасность применения во время беременности и периода лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных прием во время беременности и кормления грудью не рекомендован.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Информация о возможных взаимодействиях отсутствует. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

**Меры предосторожности.** Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача. Если при применении лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу. Если боли в суставах сопровождаются отеком суставов, покраснением кожи или повышением температуры, необходимо обратиться к врачу. Если во время приема лекарственного средства возникают такие симптомы, как повышение температуры, расстройства мочеиспускания, боли спастического характера или появляется кровь в моче, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Влияние на способность вождения автомобиля и работу с техникой.** Исследования по оценке влияния на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

**Условия хранения.** Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Водное извлечение (чай) использовать свежеприготовленным.

**Срок годности.** 2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска.** Без рецепта врача.

**Упаковка.** По 1,5 г в фильтр-пакетах бумажных №20 в пачке картонной. Предусмотрено вложение листка-вкладыша в пачку.

**Производитель.** ООО «Калина».

**Адрес.** Республика Беларусь,  
211019, Витебская область,  
Оршанский район, д. Пищалово  
Тел. (0216) 54-81-68