

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Листок-вкладыш
по медицинскому применению лекарственного средства
(информация для пациента)

КРАПИВЫ ЛИСТЬЯ
URTICAE FOLIUM

МНН. Отсутствует.

Регистрационный номер _____

Общая характеристика. Крапивы листья содержат каротиноиды, аскорбиновую кислоту, витамины группы В, К, флавоноиды, дубильные вещества, хлорофилл, соли железа, кремния и другие биологически активные вещества.

Состав. Крапивы листья, измельченное сырье.

Форма выпуска. Измельченное сырье 50 г или 100 г в пачке.

Описание. Кусочки тонких, шершавоволосистых листьев различной формы, проходящие сквозь сито (5600), темно-зеленого цвета. Запах слабый.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие диуретические средства.

Фармакологические свойства. Средство растительного происхождения.

Оказывает противовоспалительное и диуретическое действие, повышает тонус матки.

Показания к применению. Внутрь: в качестве мочегонного средства в комплексной терапии легких воспалительных заболеваний мочевыводящих путей; в качестве симптоматического средства в комплексной терапии нетяжелых болей в суставах.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозировка. 5 г (2 столовые ложки) листьев помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.


Принимают внутрь по 1/4-1/2 стакана настоя 3-5 раз в день до еды.

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Кратность приема и длительность курса лечения определяются врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Противопоказания. Повышенная чувствительность. Заболевания, при которых необходимо ограничение приема жидкости (например, заболевания почек или тяжелые заболевания сердца). Беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет. Применение лекарственного средства не рекомендовано пациентам с повышенной свертываемостью крови, кровотечениями.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции (зуд, кожная сыпь, крапивница), умеренные желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея), гиперкоагуляция. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.



СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БЕЛАРУСИ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Передозировка. Информация о случаях передозировки отсутствует. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Применение у детей. Применение у детей до 12 лет не рекомендовано в связи с отсутствием достаточных данных.

Применение во время беременности и кормления грудью. Безопасность применения во время беременности и периода лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных прием во время беременности и кормления грудью не рекомендован.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Информация о возможных взаимодействиях отсутствует. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Меры предосторожности. Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача. Если при применении лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу. Если боли в суставах сопровождаются отеком суставов, покраснением кожи или повышением температуры, необходимо обратиться к врачу. Если во время приема лекарственного средства возникают такие симптомы, как повышение температуры, расстройства мочеиспускания, боли спастического характера или появляется кровь в моче, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Влияние на способность вождения автомобиля и работу с техникой. Исследования по оценке влияния на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

Условия хранения. Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °C до 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный настой – при температуре от 8 °C до 15 °C не более 2 суток.

Срок годности. 2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска. Без рецепта врача.

Упаковка. По 50 г или 100 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. Предусмотрено вложение листка-вкладыша в пачку.

Производитель. ООО «Калина».

Адрес. Республика Беларусь,
211019, Витебская область,
Оршанский район, д. Пищалово
Тел. (0216) 54-81-68