


2578Б-2020



Л И С Т О К – В К Л А Д Ы Ш
по медицинскому применению лекарственного препарата
Сердечные капли
настойка для внутреннего применения

Название лекарственного препарата Сердечные капли.

Форма выпуска Настойка для внутреннего применения.

Общая характеристика Прозрачная жидкость желто-коричневого цвета. При хранении допускается выпадение осадка.

Состав лекарственного препарата:

	<u>На 1 мл</u>
Валерианы настойка (спиртовое извлечение валерианы корневищ с корнями (1:5))*	- 0,34 мл
Пустырника настойка (спиртовое извлечение пустырника травы (1:5))*	- 0,33 мл
Боярышника настойка (спиртовое извлечение из плодов боярышника (1:10))*	- 0,33 мл

*Экстрагент спирт этиловый 70 %

Содержит не менее 64 % спирта этилового.

Фармакотерапевтическая группа Прочие снотворные и седативные средства.

Фармакологические свойства

Лекарственный препарат представляет комбинацию настоек корневищ с корнями валерианы, травы пустырника и плодов боярышника.

Показания к применению

В комплексной терапии функциональных нарушений центральной нервной системы (нарушения сна и неврастения).

В комплексной терапии функциональных нарушений сердечно-сосудистой деятельности.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозировка

Первые 3-4 дня принимать по 20-30 капель 3-4 раза в сутки, потом суточную дозу уменьшить до 15-20 капель 2-3 раза в сутки. Принимают внутрь за 30 минут до еды, разовую дозу развести в небольшом количестве (1/4 стакана) кипяченой воды комнатной температуры. Режим дозирования и длительность курса лечения определяются врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного препарата. Не рекомендуется применять настойку в течение длительного времени из-за содержания этанола. Во время лечения необходимо избегать приема других этанолсодержащих средств. Перед употреблением взбалтывать.

Побочное действие

Возможно развитие аллергических реакций (кожная сыпь, зуд, гиперемия, отек кожи), головной боли, общей слабости, головокружения, снижения работоспособности, сонливости, раздражительности, тревожности, желудочно-кишечных расстройств (изжога, тошнота,

25785-1020

Большие дозы могут привести к брадикардии и аритмии, а также снижению моторики кишечника (запор).

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Если у Вас появились нежелательные реакции, сообщите об этом лечащему врачу. Это также относится к любым нежелательным реакциям, которые не указаны в данном листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного препарата; беременность, период лактации; детский возраст до 18 лет; артериальная гипотензия, брадикардия; язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки, эрозивный гастрит в фазе обострения.

С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, эпилепсия, черепно-мозговая травма и другие заболевания головного мозга со снижением судорожного порога

Передозировка

Симптомы. Хроническая передозировка вызывает чувство угнетенности, головную боль, сонливость, дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта, тошноту, снижение работоспособности, артериальную гипотензию, нарушение сердечной деятельности (брадикардию). Острая передозировка может вызвать алкогольную интоксикацию, появление болей в животе спастического характера, чувства стеснения в груди, головокружения, трепора рук и расширения зрачков.

Лечение. В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного препарата и обратиться к врачу. При острой передозировке необходимо провести индукцию рвоты, промывание желудка. Симптоматическая терапия.

Меры предосторожности

Лекарственный препарат содержит не менее 64 об. % этанола, т. е. до 439 мг на разовую дозу (20 капель), что эквивалентно 11 мл пива и 5 мл вина. Вреден для лиц с алкоголизмом. В связи с содержанием этилового спирта лекарственный препарат не следует принимать беременным и кормящим женщинам, детям до 18 лет, а также пациентам с заболеваниями печени, алкоголизмом, эпилепсией, черепно-мозговой травмой и другими заболеваниями головного мозга со снижением судорожного порога.

Перед приемом лекарственного препарата необходима консультация врача. Во время лечения необходим контроль артериального давления и электрокардиограммы.

Если во время лечения симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, развиваются отеки нижних конечностей, необходимо обратиться к врачу. Необходима немедленная медицинская помощь при возникновении боли в области сердца с иррадиацией в руку, верхнюю часть живота, шею, или в случае развития дыхательной недостаточности (например, одышка).

Из-за постепенного развития эффекта лекарственный препарат не рекомендовано применять в случаях экстренной необходимости уменьшения симптомов психического возбуждения и нарушений сна.

Влияние на способность к управлению автотранспортом и потенциально опасными механизмами

Лекарственный препарат содержит этиловый спирт! В период лечения необходимо отказаться от вождения автотранспортом и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в период беременности и кормления грудью

В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта применять во время беременности и лактации противопоказано.

Время беременности и *Применение у детей*

В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием спирта этилового лекарственный препарат не рекомендован для назначения детям до 18 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами
Если Вы принимаете любые другие лекарственные препараты, обязательно сообщите об этом врачу!

Не рекомендуется одновременное применение с антиаритмиками III класса, с цизапридом. Лекарственный препарат может усилить действие седативных, снотворных, анксиолитических, кардиотонических, спазмолитических, анальгезирующих и других лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему.

Комбинация лекарственного препарата Сердечные капли с синтетическими седативными средствами требует медицинского наблюдения.

Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных препаратов, содержащих этиловый спирт.

Взаимодействия, связанные с наличием в составе этилового спирта:

- лекарственные препараты, вызывающие дисульфирамоподобную реакцию (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия) при совместном приеме с алкоголем: дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксеф, хлорамфеникол, хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид и другие гипогликемические препараты, гризофульвин, метронидазол, орнидазол, тинидазол, кетоконазол, прокарбазин.
- лекарственные препараты, угнетающие функции центральной нервной системы.

Условия и срок хранения

В защищённом от света месте при температуре от 15 °C до 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта врача.

Упаковка

50 мл во флаконы из стекломассы оранжевого цвета, укупоренные пробками-капельницами и крышками навинчивающимися, с листком-вкладышем в упаковке №1.

Информация о производителе

СОАО «Ферейн»,

Республика Беларусь, 220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 52А,
тел./факс + 375 17 394-92-18; тел. + 375 17 213-16-37, +375 17 213-12-58
E-mail: office@ferane.by