

Министерство здравоохранения Республики Беларусь


Листок-вкладыш

по медицинскому применению лекарственного средства

Мирасептин

раствор/капли глазные

(информация для пациента)



Регистрационное удостоверение РБ

Торговое название: Мирасептин

Международное непатентованное название: отсутствует

Форма выпуска: раствор/капли глазные

Описание: бесцветный прозрачный раствор, пенящийся при встряхивании.

Состав: на тубик-капельницу 5 мл:

действующее вещество: мирамистин 0,5 мг;

вспомогательные вещества: вода для инъекций, натрия хлорид.

Фармакотерапевтическая группа: Офтальмологические препараты. Другие противомикробные препараты
Код АТС: S01AX

Фармакологические свойства

Мирамистин оказывает бактерицидное, противовирусное и противогрибковое действие. Препарат оказывает местное действие.

Показания к применению

Капли глазные Мирасептин, рекомендуется применять при комплексном лечении инфекционных процессов переднего отдела глаза (блефаритов, конъюнктивитов, кератита, кератоувеита), травм глаза, ожогов глаз (термических и химических); в предоперационном и послеоперационном периодах для лечения и профилактики гнойно-воспалительных осложнений.

Профилактика офтальмии новорожденных, в том числе гонококковой и хламидийной.

Способ применения и дозы.

Применяется местно.

Взрослые. С лечебной целью препарат Мирасептин закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 4-6 раз в сутки до клинического выздоровления.

С профилактической целью препарат закапывают за 2-3 суток до операции, а также в течение 10-15 дней после операции по 1-2 капли 3 раза в сутки.

При лечении ожогов глаз, после промывания глаза большим количеством воды, проводят частые инстилляци (каждые 5-10 минут) на протяжении 1-2 часов. Для дальнейшего лечения препарат применяют по 1-2 капли 4-6 раз в сутки.

Дети. Для лечения бактериальных конъюнктивитов Мирасептин закапывают в конъюнктивальный мешок по 1 капле до 6 раз в сутки в течение 7-10 дней.

Новорожденные. Для профилактики офтальмии у новорожденных сразу после рождения ребенку закапывают по 1 капле препарата в каждый глаз 2 раза с интервалом 2-3 минуты.

Рекомендации по использованию тубик-капельниц.

Тюбик-капельницы предназначены для многократного применения. Перед закапыванием необходимо тщательно вымыть руки, а затем снять с тюбик-капельницы защитный колпачок, повернув его до полного открытия. Закиньте голову назад или лягте на спину. Поднесите тюбик-капельницу к глазу, не касаясь ресниц или век. Аккуратно оттяните указательным пальцем нижнее веко вниз, чтобы образовался карман, в который нужно закапать препарат. Смотрите вверх. Мягко нажмите на корпус тюбик-капельницы и закапайте необходимое количество капель. Закройте глаза на 1-2 минуты, не сжимая сильно веки. Чтобы мирамистин не утекал в нос, мягко нажмите пальцем на внутренний угол глаза. После применения корпус тюбик-капельницы необходимо перевернуть горловиной вверх и накрутить защитный колпачок.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. В отдельных случаях может возникнуть ощущение легкого жжения, дискомфорт, которые проходят самостоятельно через 15-20 секунд и не требуют отмены препарата.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Данная рекомендация распространяется на возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в инструкции по применению препарата. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях через национальную систему сообщения о нежелательных реакциях и неэффективности лекарственных препаратов (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», <https://www.rceth.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства Здравоохранения
Республики Беларусь № _____ от _____
распространяется на любые

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к препарату.

Передозировка

Случаев передозировки не было зафиксировано.

Меры предосторожности

Контактные линзы следует снимать непосредственно перед закапыванием препарата Мирасептин и надевать не ранее чем через 15 минут после закапывания. Для предотвращения загрязнения раствора препарата при закапывании пациентам следует избегать контакта кончика капельницы с глазом и кожей. Пользование тюбик-капельницей более чем одним лицом может привести к распространению инфекции.

Применение при беременности и лактации

Применение препарата при беременности и период грудного вскармливания возможно только в том случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Влияние на способность управления автомобилем и работу с механизмами

В период лечения необходимо воздержаться от вождения автотранспорта и от занятий другими, потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания, быстроты психомоторных реакций и хорошего зрения в течение 30 минут после закапывания в глаз.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При совместном применении мирамистина повышает эффективность антибиотиков местного действия. Исследования взаимодействия с другими препаратами не проводились.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C.

Вскрытую тубик-капельницу хранить в течение 1 месяца.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности


2 года

Условия отпуска

По рецепту врача.

Упаковка

По 5 мл в тубик-капельницы. 1 или 5 тубик-капельниц и инструкция по применению помещают в пачку.



Производитель

Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «Фармлэнд», (СП ООО «Фармлэнд»), Республика Беларусь, Минская область, г. Несвиж, ул. Ленинская, 124 - 3, тел/факс 373-31-90.