



**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
**(информация для пациента)**  
**лекарственного средства**  
**КАЛЕНДУЛЫ НАСТОЙКА**  
**для наружного применения**  
*(Tinctura Calendulae)*

*Прочтайте внимательно этот листок-вкладыш перед тем, как начать применение лекарственного средства.*

*Сохраняйте этот листок – вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его еще раз.*

*Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.*

**Торговое название.** Календулы настойка.

**Международное непатентованное название (МНН).** Отсутствует.

**Форма выпуска.** Настойка.

**Состав.** Спиртовое извлечение из цветков ноготков (цветков календулы) – 1:10. Содержит не менее 65,0 % этианола.

**Описание.** Прозрачная жидкость от желтовато-коричневого до желтовато-бурого цвета со специфическим запахом.

**Фармакотерапевтическая группа.** Препараты для лечения заболеваний горла.  
**Антисептики.**

**Фармакологические свойства.** Биологически активные вещества, содержащиеся в цветках календулы, оказывают местное противовоспалительное, антисептическое и репаративное действие.

**Показания к применению.** Лекарственное средство используется для полосканий в комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта (гингивит, стоматит, пародонтит) и глотки (тонзиллит), симптоматического лечения легких воспалительных процессов кожи и небольших поверхностных ран.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Способ применения и дозы.** Для приготовления раствора 1 чайную ложку календулы настойки разводят в стакане теплой кипяченой воды.

Приготовленный раствор применяют для полоскания полости рта и глотки, а также для наружного применения (повязки, аппликации).

Способ применения лекарственного средства для местных аппликаций зависит от характера поражения и определяется врачом.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта. Не рекомендуется применять настойку в течение длительного времени из-за содержания этанола.

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как ромашка, арника, амброзия, пижма, астра, полынь, хризантема.

Детский возраст до 6 лет для наружного применения (при заболеваниях кожи). Детский возраст до 12 лет для местного применения (при воспалительных заболеваниях полости рта и глотки). Период беременности и кормления грудью.

**Побочное действие.** Возможны аллергические реакции на компоненты лекарственного средства.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Передозировка.** Возможно усиление побочных явлений. *Лечение:* отмена лекарственного средства, при необходимости проводят симптоматическую терапию.


**Особые указания.** Не применять лицам, склонным к аллергическим реакциям на препараты календулы. Если после применения лекарственного средства в течение одной недели симптомы сохраняются, необходимо обратиться к врачу.

В случае ухудшения состояния или появления признаков инфицирования раны, необходимо обратиться к врачу.

**Применение в период беременности и кормления грудью.** В связи с отсутствием достаточных данных не рекомендуется применять лекарственное средство в период беременности и кормления грудью.

**Применение у детей.** Лекарственное средство не рекомендовано для детей до 6 лет для наружного применения (при заболеваниях кожи), для детей до 12 лет – для местного применения (при воспалительных заболеваниях полости рта и глотки).

**Влияние на способность управлять автотранспортом или другими механизмами.** Лекарственное средство содержит этиловый спирт! При



случайном приеме внутрь лекарственное средство влияет на способность управлять автотранспортом и другими механизмами. Следует соблюдать осторожность во время местного применения лекарственного средства.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Не установлено. В случае одновременного применения других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

**Условия хранения.** Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от огня.

**Условия отпуска из аптек.** Отпускают без рецепта врача.

**Срок годности.** 3 года.

*Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.*

**Упаковка.** По 50 мл в бутылки / флаконы полимерные с полиэтиленовой пробкой-капельницей и навинчивающей пластмассовой/ полимерной крышкой в упаковке № 1 с листком-вкладышем.

**Производитель.** ЗАО «БелАсептика», Республика Беларусь, 223043, Минская обл., Минский р-н, д. Цнянка, ул. Армейская, 8, комн. 7.

Тел. (017) 500 33 11, тел./факс (017) 500 33 46.