

Листок-вкладыш: информация для потребителя
Декспантен® Плюс, крем для наружного применения, (50 мг/г) НДРБ
декспантенол / хлоргексидина дигидрохлорид


23185 - 2021

Прочитайте внимательно листок-вкладыш перед началом применения лекарственного препарата, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте лекарственный препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет лекарственный препарат Декспантен® Плюс, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением лекарственного препарата Декспантен® Плюс
3. Как применять лекарственный препарат Декспантен® Плюс
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение лекарственного препарата Декспантен® Плюс
6. Содержимое упаковки и прочие сведения



1. Что из себя представляет лекарственный препарат Декспантен® Плюс, и для чего его применяют

Декспантен® Плюс содержит в качестве действующих веществ декспантенол и хлоргексидина дигидрохлорид и относится к группе антисептических и дезинфицирующих средств.

Декспантенол в клетках кожи быстро превращается в пантотеновую кислоту и действует как витамин. Пантотеновая кислота необходима для формирования эпителия и регенерации кожи и слизистых оболочек.

Хлоргексидина дигидрохлорид – антисептик, обладающий бактерицидным действием в отношении грамположительных бактерий, особенно чувствительных к нему штаммов *Staphylococcus aureus*, наиболее часто являющихся возбудителями инфекционных заболеваний кожи.

Хлоргексидина дигидрохлорид проявляет меньшую активность в отношении грамотрицательных патогенных микроорганизмов. Некоторые виды *Pseudomonas* и *Proteus* устойчивы к хлоргексидину. Хлоргексидина дигидрохлорид оказывает слабую противогрибковую и не оказывает противовирусной активности.

Декспантен® Плюс применяется для лечения поверхностных повреждений кожи: мелкие раны, ссадины, порезы, царапины, ожоги, укусы, при которых существует риск инфицирования, а также в качестве местного антисептического препарата в малоинвазивной хирургии.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением лекарственного препарата Декспантен® Плюс

Не применяйте лекарственный препарат Декспантен® Плюс, если у Вас:

- повышенная чувствительность (аллергия) к декспантенолу и/или хлоргексидина дигидрохлориду или к любому из компонентов препарата (см. раздел 6).
- имеется перфорация барабанной перепонки.

2318Б - 2021

Особые указания и меры предосторожности при применении

Перед началом применения препарата Декспантен® Плюс проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не следует применять препарат на больших участках кожи, так как он предназначен для малых поражений кожи.

Редкие, но серьезные аллергические реакции (см. раздел 4), включая анафилаксию, были зарегистрированы в связи с использованием антисептических препаратов, содержащих хлоргексидин. Если появляются симптомы серьезной аллергической реакции (например, свистящее или затрудненное дыхание, отек лица, крапивница, которая может быстро прогрессировать в направлении более серьезных симптомов, сильная сыпь или шок) **немедленно прекратите применение препарата и обратитесь к врачу.**

Следует избегать попадания крема в глаза, слуховой проход и на слизистые оболочки.

Декспантен® Плюс не следует применять для обработки раздражений кожи с небольшой вероятностью инфицирования (например, при солнечных ожогах).

Если симптомы сохраняются или ухудшаются, необходимо обратиться к врачу.

Другие лекарственные препараты и Декспантен® Плюс

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Хлоргексидин несовместим с омыливающими веществами и прочими анионными соединениями. Декспантен® Плюс не рекомендуется применять одновременно с другими антисептиками для предупреждения их взаимного влияния (антагонизм действия или инактивация).

Беременность и грудное вскармливание

При беременности, вероятной беременности или планировании беременности, а также при кормлении грудью Вам следует обратиться к врачу перед тем, как применять лекарственный препарат.

Если в процессе применения препарата Вы предположите или установите, что Вы беременны, проконсультируйтесь с врачом насчет возможности продолжения лечения данным препаратом.

Нет данных, свидетельствующих о необходимости ограничивать применение препарата в период беременности и грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Декспантен® Плюс не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами.

Вспомогательные вещества

Ланолин, цетиловый и стеариловый спирты, входящие в состав препарата, могут вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

3. Как применять лекарственный препарат Декспантен® Плюс

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача и работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

23186 - 2021

Крем Декспантен® Плюс наносят на предварительно очищенную раневую поверхность или на воспаленные участки кожи один или несколько раз в сутки (в зависимости от потребности).

При необходимости возможно применение повязок.

Если Вы пропустили применение препарата Декспантен® Плюс, не используйте двойную дозу, чтобы восполнить пропущенную дозу.

Если Вы использовали большее количество лекарственного препарата Декспантен® Плюс, чем следовало

Декспантен® Плюс хорошо переносится даже при использовании значительного количества крема. Опасности с передозировкой не возникает. При случайном попадании в рот никаких специальных мер не требуется. При случайном попадании в глаза возможно незначительное раздражение, которое устраняется промыванием водой или изотоническим раствором натрия хлорида.

Частое местное применение препарата на одном участке кожи может привести к раздражению кожных покровов.

В случае возникновения дополнительных вопросов по применению лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам Декспантен® Плюс может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Состояния, на которые требуется обращать особое внимание (наиболее серьезные нежелательные реакции)

Гиперчувствительность, анафилактические реакции и анафилактический шок (частота неизвестна, но вероятность развития реакции имеется [невозможно определить частоту на основании имеющихся данных]). Возможные проявления: быстрое появление зудящих, приподнятых над кожей высыпаний (крапивница); иные разновидности сыпи, покраснение или побледнение кожи; спазм бронхов, приводящий к затруднению дыхания; резкое снижение артериального давления, быстрый и слабый пульс; боль в животе, тошнота, рвота или диарея; головокружение, обморок или предобморочное состояние.

Другие возможные нежелательные реакции

Частота неизвестна: аллергические реакции, в том числе кожные аллергические реакции: контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, покраснение, раздражение кожи, сыпь, в том числе пузырьковая сыпь.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства-члена. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение лекарственного препарата Декспантен® Плюс

2 года. Срок годности указан на упаковке.

Не использовать после даты, указанной на упаковке.

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

6. Содержимое упаковки и прочие сведения**Препарат Декспантен® Плюс содержит**

Действующие вещества: декспантенол и хлоргексидина дигидрохлорид.

1 г крема содержит 50 мг декспантенола и 5 мг хлоргексидина дигидрохлорида.

Вспомогательные вещества: D,L-пантолактон, парафин мягкий белый, парафин жидкий, цетиловый спирт, ланолин, макрогола стеарат, стеариловый спирт, вода очищенная.

Внешний вид лекарственного препарата Декспантен® Плюс и содержимое упаковки

Крем для наружного применения.

Однородный крем почти белого цвета со слабым специфическим запахом.

По 15 г, 30 г и 50 г в тубах из полимерных материалов или по 30 г и 50 г в тубах из комбинированного материала с бушонами. Тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

ООО «Фармтехнология»

Республика Беларусь, 220024 г. Минск, ул. Корженевского, 22.

Телефон/факс: (017) 309 44 88, e-mail: ft@ft.by.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь