



НД РБ

04775 - 2020

**Листок-вкладыш – информация для потребителя**  
**КАСОЛИН, капсулы 200 мг**  
**Действующее вещество: касолин**

**Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 данного листка-вкладыша.

**Содержание листка-вкладыша**

1. Что собой представляет препарат КАСОЛИН и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата КАСОЛИН
3. Применение препарата КАСОЛИН
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата КАСОЛИН
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что собой представляет препарат КАСОЛИН, и для чего его применяют**

Препарат КАСОЛИН содержит действующее вещество касолин, маслянистый экстракт бобровой струи. По своему действию касолин относится к группе адаптогенов. Адаптогены как правило, неспецифичны по своим фармакологическим свойствам и действуют путем повышения устойчивости организма к широкому спектру неблагоприятных биологических, химических и физических факторов. Адаптогены являются регуляторами, оказывающими нормализующее воздействие на различные системы органов организма-реципиента; что может в свою очередь способствовать нормализации либидо и эректильной функции. КАСОЛИН применяется в составе комплексной терапии симптомов мужского климакса, таких как снижение настроения и полового влечения.

**2. О чем следует знать перед применением препарата КАСОЛИН**


**Не принимайте КАСОЛИН, если:**

- у Вас аллергия на касолин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- у Вас органические поражения (например, инфекции, травмы, опухоли) мочеполовой системы;
- у Вас заболевания передающиеся половым путем;
- у Вас заболевания надпочечников;
- Ваш возраст менее 18 лет.

Если Вы не уверены, относится ли к Вам что-либо из выше перечисленного, сообщите лечащему врачу перед приемом КАСОЛИН.

**Особые указания и меры предосторожности**

Специальных мер предосторожности не требуется.



Препарат содержит метилпарагидроксibenзоат E 218, который может вызывать аллергические реакции (в том числе, отсроченные).

#### **Дети и подростки**

Препарат КАСОЛИН не следует давать детям или подросткам до 18 лет вследствие недостаточного количества данных о его эффективности и безопасности у данной возрастной группы.

#### **Другие препараты и КАСОЛИН**

Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать любые другие препараты. Это относится к любым растительным препаратам или препаратам, которые Вы купили без назначения.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если Вы принимаете препараты растительного происхождения, обладающие седативным, спазмолитическим действием. Такие препараты могут усиливать эффект касолина.

#### **Беременность, грудное вскармливание и фертильность**

КАСОЛИН показан к применению у мужчин.

#### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

КАСОЛИН не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

### **3. Применение препарата КАСОЛИН**

Стандартная доза 0,2 г \* 3 раза в день 15-30 дней.

При отсутствии или недостаточном эффекте после 15 дней применения доза может быть увеличена в два раза: 0,4 \* 2 раза в день.

Максимальная суточная доза 1200 мг в сутки.

При необходимости повторные курсы лечения проводятся с интервалом 4-6 месяцев.

#### **Особенности применения у пациентов старше 65 лет**

Применение у пациентов старше 65 лет требует осторожности, в связи с тем, что данные касающиеся особенностей применения ограничены.

#### **Если вы приняли препарата КАСОЛИН больше, чем следовало**

При приеме лекарственного препарата в высоких дозах возможны головная боль, диспепсические расстройства.

Если Вы приняли больше назначенной дозы, обратитесь за медицинской помощью.

#### **Если Вы пропустили прием препарата КАСОЛИН**

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Если вы забыли принять таблетку, примите обычную дозу, когда наступит время следующего приема.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

### **4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам, КАСОЛИН может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Лекарственный препарат обладает хорошей переносимостью.

Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата, при их возникновении лечение препаратом следует прекратить.

#### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории

НД РБ

04775 - 2020

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

Версия 2

государства (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», [www.rceth.by](http://www.rceth.by)).  
Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

### 5. Хранение препарата КАСОЛИН

Хранить препарат в защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить препарат в недоступном и невидимом для детей месте.

Срок годности – 2 года.

Не применяйте препарат по истечении срока годности.

Не применяйте препарат, если Вы заметили, что контурная ячейковая упаковка, в которой находятся капсулы, повреждена.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от остатков препарата, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

### 6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

*Действующим веществом* препарата является касолин (с содержанием суммы фенольных соединений не менее 0,57 мг) – 200 мг.

*Состав оболочки мягкой желатиновой капсулы:* желатин, глицерин, метилпарагидроксибензоат (Е218).

#### Внешний вид препарата КАСОЛИН и содержимое упаковки

Капсулы мягкие желатиновые почти сферической формы, от желтого до коричневого цвета. Содержимое капсул – маслянистая жидкость от желтого до коричневого цвета с характерным мускусным запахом и специфическим горьким вкусом. Допускается наличие небольшого осадка на стенках капсулы.

По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По две или пять контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

**Условия отпуска:** без рецепта.

#### Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30, тел./факс: (+375 17) 220 37 16,

e-mail: [medic@belmedpreparaty.com](mailto:medic@belmedpreparaty.com)



Листок-вкладыш пересмотрен: