



Инструкция по медицинскому применению

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

ГЕКСОСЕПТ-Рн,

16 мг, суппозитории вагинальные

Действующее вещество: хлоргексидина биглюконат 16 мг

Перед применением данного препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Гексосепт-Рн и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Гексосепт-Рн.
3. Применение препарата Гексосепт-Рн.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Гексосепт-Рн.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ГЕКСОСЕПТ-Рн И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Лекарственный препарат Гексосепт-Рн содержит хлоргексидина биглюконат.

Фармакотерапевтическая группа:

Антисептические и противомикробные средства для применения в гинекологии (исключая комбинации с кортикостероидами). Прочие противомикробные и антисептические средства. Гексосепт-Рн – антисептический препарат для местного применения, активен в отношении простейших, грамположительных и грамотрицательных бактерий: *Treponema pallidum*, *Chlamydia* spp., *Ureaplasma* spp., *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides fragilis*. К препарату слабочувствительны некоторые штаммы *Pseudomonas* spp, *Proteus* spp., а также устойчивы кислотоустойчивые формы бактерий, споры бактерий, грибы, вирусы. Хлоргексидин не нарушает функциональную активность лактобактерий. Сохраняет активность (хотя и несколько пониженную) в присутствии крови, гноя.

Показания к применению

Гексосепт-Рн предназначен для интравагинального применения только у взрослых пациентов:

- Лечение бактериального вагиноза, кольпитов (в том числе неспецифических, смешанных, трихомонадных).
- Профилактика инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии (перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, перед родами и абортom, до

1648Б-2017

и после установки внутриматочной спирали (ВМС), до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочными исследованиями).

– Профилактика инфекций, передаваемых половым путем (хламидиоз, уреаплазмоз, трихомониаз, гонорея, сифилис, генитальный герпес и др.).

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ГЕКСОСЕПТ-Рн

Не применяйте препарат Гексосепт-Рн

- если у Вас повышенная чувствительность к хлоргексидину и другим компонентам препарата

- детский возраст до 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Гексосепт-Рн проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат предназначен для применения только у взрослых пациентов.

При появлении аллергических реакций или раздражения в месте введения препарата лечение прекращают.

При применении препарата возможно увеличение количества выделений из влагалища. Как правило, при небольшом количестве прозрачных выделений лечение препаратом можно не прерывать. При появлении сукровичных выделений пациентке рекомендуется прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.

После контакта с препаратом следует вымыть руки, во избежание возможного попадания хлоргексидина в глаза.

Дети и подростки

Противопоказан детям и подросткам до 18 лет.

Другие препараты и препарат Гексосепт-Рн

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Не рекомендуется одновременное применение Гексосепта-Рн с йодсодержащими препаратами, используемыми интравагинально.

Препарат Гексосепт-Рн не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза), и мылами, если они вводятся интравагинально.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата Гексосепт-Рн проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не противопоказан во время беременности и в период лактации. Применение препарата возможно после тщательной оценки ожидаемой пользы для матери и риска для плода и ребенка.


Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Применение препарата не влияет на способность управлять автотранспортом и потенциально опасными механизмами.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ГЕКСОСЕПТ-Рн

Лекарственный препарат Гексосепт-Рн отпускается без рецепта врача.

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.



Рекомендуемая доза

Для лечения: по 1 вагинальному суппозиторию 1-2 раза в сутки в течение 7-10 дней.

Для профилактики инфекций, передаваемых половым путем: 1 вагинальный суппозиторий не позднее 2 часов после незащищенного полового акта.

Применение у детей и подростков

Противопоказан к применению у детей и подростков в возрасте до 18 лет.

Путь и способ введения

Для интравагинального применения. Перед применением суппозиторий следует извлечь из контурной упаковки и ввести глубоко во влагалище.

Продолжительность терапии

При лечении Гексосепт-Рн применяют в течение 7-10 дней. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней.

Продолжительность терапии определяется лечащим врачом.

Если Вы применили большее количество препарата Гексосепт-Рн, чем следовало

Применяйте Гексосепт-Рн в соответствии с рекомендациями лечащего врача или в дозах, указанных в листке-вкладыше к препарату.

Сообщений о случаях передозировки не поступало.

Если Вы забыли принять Гексосепт-Рн

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Гексосепт-Рн может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При приеме препарата могут возникать следующие нежелательные реакции:

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- аллергические реакции: сыпь, зуд, крапивница;
- раздражение слизистой оболочки влагалища (жжение, зуд), сукровичные выделения из влагалища.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- тяжелые аллергические реакции и анафилаксия.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных.

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ГЕКСОСЕПТ-Рн

Храните препарат в недоступном и незаметном для детей месте.

Срок годности препарата 2 года.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Храните препарат в защищенном от света и влаги месте, при температуре не выше 15 °С.

Проконсультируйтесь с работником аптеки о том, как следует утилизировать ненужный лекарственный препарат. Эти меры способствуют защите окружающей среды.

**6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ****Препарат Гексосепт-Рн содержит**

Действующим веществом препарата является хлоргексидина биглюконат.

Каждый суппозиторий содержит:

Действующее вещество: хлоргексидина биглюконата 16 мг в виде ~~40 мг~~ 20% раствора хлоргексидина биглюконата.

Вспомогательное вещество: макрогол 1000 – до 3,10 г.

16485-2017

Внешний вид препарата Гексосепт-Рн и содержимое упаковки

Гексосепт-Рн представляет собой суппозитории вагинальные, торпедовидной формы, белого или желтовато-белого цвета. Допускается неоднородность окраски в виде мраморности и наличие воронкообразного углубления. На продольном срезе допускается наличие воздушного стержня.

По 5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из полимерной пленки ПВХ/ПЭ.

Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

ООО «Рубикон», Республика Беларусь,
210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б,
тел/факс: +375 (212) 36-37-06, тел.: +375 (212) 36-47-77,
e-mail: secretar@rubikon.by

Данный листок-вкладыш пересмотрен
12/2021

