


НД РБ

1482Б-2015



**Листок-вкладыш: информация для потребителя**

**Лизиноприл ФТ, таблетки 5 мг, 10 мг, 20 мг**  
лизиноприл (в виде лизиноприла дигидрата)

Перед началом применения лекарственного препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Лекарственный препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

**Содержание листка-вкладыша**

- Что представляет собой лекарственный препарат Лизиноприл ФТ, и для чего его применяют
- О чём следует знать перед применением лекарственного препарата Лизиноприл ФТ
- Как применять лекарственный препарат Лизиноприл ФТ
- Возможные нежелательные реакции
- Хранение лекарственного препарата Лизиноприл ФТ
- Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что представляет собой лекарственный препарат Лизиноприл ФТ, и для чего его применяют**

Препарат Лизиноприл ФТ содержит в качестве действующего вещества лизиноприл. Лизиноприл относится к группе антигипертензивных лекарственных препаратов, называемых ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (ингибиторы АПФ).

Лизиноприл ингибирует ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), который необходим для реакции превращения ангиотензина I в ангиотензин II – вещество, которое оказывает сосудосуживающий эффект. Угнетение АПФ приводит к снижению концентрации ангиотензина II в плазме крови, что, в свою очередь, приводит к расширению сосудов. Вследствие этого снижается артериальное давление и уменьшается нагрузка на сердце.

**Показания для применения лекарственного препарата Лизиноприл ФТ:**

- Артериальная гипертензия**  
Лечение артериальной гипертензии.
- Сердечная недостаточность**  
Лечение сердечной недостаточности.
- Острый инфаркт миокарда**  
Кратковременное (до 6 недель) лечение гемодинамически стабильных пациентов, начатое в период до 24 часов после острого инфаркта миокарда.
- Диабетическая нефропатия**  
Лечение поражения почек у пациентов с гипертензией в сочетании с сахарным диабетом 2 типа и начальной стадией нефропатии.

**2. О чём следует знать перед применением лекарственного препарата Лизиноприл ФТ**

1482Б-2015

**Не принимайте лекарственный препарат Лизиноприл ФТ:**

- если у Вас повышенная чувствительность (аллергия) к лизиноприлу и/или к любому из вспомогательных компонентов лекарственного препарата (см. раздел 6 листка-вкладыша);
- если у Вас повышенная чувствительность (аллергия) к другим ингибиторам АПФ. Симптомы аллергической реакции могут включать отек конечностей, лица, губ, языка или горла. Также может возникать затруднение глотания или затруднение дыхания (ангионевротический отек);
- если у члена Вашей семьи была тяжелая аллергическая реакция (ангионевротический отек) на ингибиторы АПФ или если у Вас была тяжелая аллергическая реакция (ангионевротический отек) с известной причиной;
- если Вы принимаете или недавно принимали препараты, содержащие сакубитрил/валсартан (препарат для лечения хронической сердечной недостаточности), так как при этом возрастает риск возникновения ангионевротического отека (отек гортани, голосовой щели, лица, губ, глотки и/или языка, способный привести к затруднению дыхания вследствие ухудшения проходимости дыхательных путей, к затруднению глотания или к ухудшению способности говорить);
- во 2-ом и 3-ем триместре беременности;
- если у Вас сахарный диабет или нарушение функции почек (скорость клубочковой фильтрации < 60 мл/мин/1,73м<sup>2</sup>) и Вы уже принимаете лекарственные препараты, содержащие алискирен.


*Не применяйте препарат Лизиноприл ФТ, если к Вам относится что-либо из вышеперечисленного. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь с врачом перед тем, как применять препарат Лизиноприл ФТ.*

**Особые указания и меры предосторожности при применении**

*Перед применением лекарственного препарата Лизиноприл ФТ проконсультируйтесь с лечащим врачом.*

Перед применением лекарственного препарата Лизиноприл ФТ сообщите лечащему врачу о следующих состояниях:

- если у Вас имеются заболевания сердца или печени, сахарный диабет;
- если у Вас имеется заболевание почек или Вы находитесь на диализе;
- если у Вас имеется коллагенозное сосудистое заболевание, такое как склеродермия или системная красная волчанка;
- если у Вас низкое артериальное давление;
- если у Вас наблюдались значительные потери солей или жидкости (у Вас была рвота, диарея, повышенное потоотделение, пребывание на диете с низким содержанием соли, длительное применение мочегонных препаратов, лечение диализом);
- если Вам предстоит лечение для уменьшения аллергии на укусы пчел или ос (десенсибилизация);
- если Вам предстоит применение анестезии (например, при хирургической или стоматологической операции). Вам может потребоваться прекратить применение лекарственного препарата Лизиноприл ФТ за день до этого. Проконсультируйтесь с врачом;
- если у Вас высокое содержание калия в крови (по результатам анализа крови);
- если Вы применяете препараты, которые могут повысить риск возникновения ангионевротического отека – серьезной аллергической реакции, такие как ингибиторы mTOR (например, темсиролимус, эверолимус, сиролимус), вилдаглиптин, ингибиторы неприлизина (такие как рацекадотрил) или сакубитрил/валсартан. Что касается комбинации сакубитрил/валсартан, см. информацию под заголовком «Не принимайте лекарственный препарат Лизиноприл ФТ»;



- если Вы применяете любой из следующих лекарственных препаратов для снижения артериального давления:
  - антагонисты рецепторов ангиотензина II (также известные как «сартаны» - например, лозартан, валсартан, телмисартан, ирбесартан), особенно если у Вас есть проблемы с почками, связанные с сахарным диабетом;
  - алискирен.
- Возможно, Вашему врачу потребуется регулярно проверять Вашу функцию почек, артериальное давление и содержание электролитов (например, калия) в крови (см. также информацию в разделе «Не принимайте лекарственный препарат Лизиноприл ФТ»);
- если у Вас высокий уровень холестерина и Вам предстоит процедура, называемая «афтерез ЛПНП».

Вы должны сообщить врачу, если Вы думаете или уверены, что беременны (или планируете беременность). Лизиноприл ФТ не рекомендуется применять в первые 3 месяца беременности, и он противопоказан при сроке беременности более 3 месяцев (во втором и третьем триместрах беременности), так как может вызвать серьезные нарушения у ребенка (см. раздел «Беременность и грудное вскармливание»).

Как и в случае с другими схожими препаратами для снижения артериального давления, эффект лекарственного препарата Лизиноприл ФТ может быть несколько ниже у пациентов негроидной расы. У таких пациентов также повышена вероятность возникновения нежелательной реакции «англоневротический отек» (тяжелая аллергическая реакция).

#### **Дети и подростки**

Препарат Лизиноприл ФТ может применяться у детей только для лечения артериальной гипертензии. Препарат Лизиноприл ФТ не рекомендуется применять у детей младше 6 лет или у детей с тяжелым нарушением функции почек.

*Если что-либо из вышеперечисленного относится к Вам (или вызывает у Вас сомнения), проконсультируйтесь с врачом перед тем, как применять препарат Лизиноприл ФТ.*

#### **Другие лекарственные препараты и Лизиноприл ФТ**

*Сообщите своему лечащему врачу, если Вы применяете в настоящее время, недавно применяли или можете применять какие-либо другие лекарственные препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта.*

В частности, сообщите лечащему врачу, если вы принимаете какие-либо из следующих препаратов:

- другие препараты для снижения артериального давления;
- препараты нитратов (применяются при ишемической болезни сердца);
- антагонисты рецепторов ангиотензина II или алискирен. Вашему лечащему врачу может потребоваться скорректировать дозу и/или принять другие меры предосторожности (также ознакомьтесь с информацией под заголовками «Не принимайте лекарственный препарат Лизиноприл ФТ» и «Особые указания и меры предосторожности при применении»);
- диуретики (мочегонные препараты), такие как фуросемид;
- лекарственные препараты, применяемые для облегчения боли и воспаления (например, нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), такие как ибупрофен или индометацин, и ацетилсалициловая кислота в дозах 3 г в сутки и более);
- литий (средство для лечения психических заболеваний). Лизиноприл может повысить уровень лития в крови. Содержание лития в крови должно тщательно контролироваться лечащим врачом;

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

- средства для анестезии, трициклические антидепрессанты и антипсихотические препараты (средства для лечения психических заболеваний);
- средства для лечения сахарного диабета, такие как пероральные препараты для снижения уровня глюкозы и инсулин. Лизиноприл может снизить уровень глюкозы в крови. Проверяйте уровень глюкозы в крови во время лечения препаратом Лизиноприл ФТ;
- препараты, которые могут повысить уровень калия в крови, такие как спиронолактон, триамтерен, амилорид, соли калия, калийсодержащие заменители соли, триметоприм или комбинация триметоприм/сульфаметоксазол (ко-тримоксазол), гепарин (для разжижения крови);
- средства для предотвращения отторжения органов после трансплантации, такие как циклоспорин;
- лекарственные препараты, применяемые при низком артериальном давлении, шоке, сердечной недостаточности, астме или аллергии, такие как эфедрин, норадреналин или адреналин. Лечащему врачу потребуется проверить Ваше артериальное давление;
- препараты для подавления иммунного ответа организма (иммунодепрессанты);
- аллопуринол (средство, применяемое для снижения уровня мочевой кислоты в крови);
- прокаинамид (средство, применяемое при нарушениях сердечного ритма);
- инъекционные золотосодержащие препараты (такие как ауротиомалат натрия).

Следующие препараты при совместном применении с лизиноприлом могут увеличить риск возникновения ангионевротического отека (отек горлани, голосовой щели, лица, губ, глотки и/или языка, способный привести к затруднению дыхания вследствие ухудшения проходимости дыхательных путей, к затруднению глотания или к ухудшению способности говорить):

- сакубитрил/валсартан – средство, применяемое для лечения хронической сердечной недостаточности у взрослых (см. информацию под заголовком «Не принимайте лекарственный препарат Лизиноприл ФТ»);
- тромболитические препараты (активаторы тканевого плазминогена), обычно назначаемые в больнице;
- темсиролимус (средство для лечения рака);
- сиролимус, эверолимус (средства для профилактики отторжения трансплантата);
- рацекадотрил (средство для лечения диареи);
- вилдаглиптин (средство для лечения сахарного диабета 2 типа).

### **Беременность и грудное вскармливание**

*При беременности, вероятной беременности или планируемой беременности, а также при кормлении грудью Вам следует обратиться к врачу перед тем, как применять лекарственный препарат Лизиноприл ФТ. Также в обязательном порядке сообщите врачу, если у Вас сохранен репродуктивный потенциал (то есть, не может быть исключена вероятность наступления беременности, даже если Вы ее не планируете).*

### **Беременность**

**Вы должны немедленно сообщить врачу, если Вы думаете или уверены, что беременны, или если Вы планируете беременность.** В случае планирования беременности или наступления беременности врач, вероятно, порекомендует Вам прекратить прием лекарственного препарата Лизиноприл ФТ и подберет для Вас другой лекарственный препарат для контроля артериального давления, если это будет необходимо.

**Лизиноприл ФТ не рекомендуется принимать на ранних сроках беременности (в первые 3 месяца беременности).**

**Лизиноприл ФТ противопоказан во 2-ом и 3-ем триместрах беременности, так как может нанести серьезный вред ребенку.**

### **Грудное вскармливание**

СОГЛАСОВАНО МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь
---

**Лизиноприл ФТ не рекомендуется принимать кормящим матерям.** Ваш врач может назначить Вам другое лечение, если Вы желаете продолжить кормление, особенно если Ваш ребенок новорожденный или родился недоношенным.

#### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

В некоторых случаях при приеме препарата возникает головокружение или чувство усталости. При возникновении таких ощущений Вам не следует управлять транспортными средствами или использовать механическое оборудование. Прежде чем управлять транспортными средствами или работать с механическим оборудованием, Вам необходимо тщательно оценить свою реакцию на прием лекарственного препарата Лизиноприл ФТ.

#### **3. Как принимать лекарственный препарат Лизиноприл ФТ**

*Всегда применяйте данный лекарственный препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.*

Лизиноприл ФТ следует принимать ежедневно, в одно и то же время, независимо от приема пищи. Таблетку необходимо проглотить целиком, запивая достаточным количеством жидкости (например, стаканом воды).

Продолжайте принимать Лизиноприл ФТ так долго, как Вам порекомендовал лечащий врач: это длительное лечение. Важно принимать препарат каждый день.

#### Прием первой дозы

Соблюдайте осторожность при приеме лекарственного препарата Лизиноприл ФТ в первый раз или при увеличении дозы, так как возможно более значительное снижение артериального давления, чем при приеме предшествующих более низких доз.

При значительном снижении артериального давления у Вас может возникнуть ощущение головокружения. Переход в лежачее положение поможет облегчить данное состояние.

#### Взрослые

Доза лизиноприла подбирается лечащим врачом индивидуально в зависимости от Вашего состояния и от того, принимаете ли Вы какие-либо другие лекарственные препараты.

#### Для лечения артериальной гипертензии

- рекомендуемая начальная доза составляет 10 мг 1 раз в сутки;
- поддерживающая доза обычно составляет 20 мг 1 раз в сутки.

#### Для лечения сердечной недостаточности

- рекомендуемая начальная доза составляет 2,5 мг 1 раз в сутки;
- поддерживающая доза обычно составляет от 5 до 35 мг 1 раз в сутки.


#### После острого инфаркта миокарда

- рекомендуемая начальная доза составляет 5 мг в период до 24 часов после инфаркта миокарда и 5 мг в следующий день;
- поддерживающая доза обычно составляет 10 мг 1 раз в сутки.

#### Для лечения диабетической нефропатии

- рекомендуемая доза составляет 10 мг или 20 мг 1 раз в сутки.

Пациентам пожилого возраста, пациентам с заболеваниями почек, а также в случае применения диуретических средств врач может назначить дозу меньше обычной.



**Применение у детей (в возрасте от 6 лет) для лечения артериальной гипертензии**

- Лизиноприл ФТ не рекомендуется детям до 6 лет;
- Лизиноприл ФТ не рекомендуется детям с тяжелой почечной недостаточностью (скорость клубочковой фильтрации < 30 мл/мин/1,73 м<sup>2</sup>);
- доза лизиноприла подбирается врачом индивидуально в зависимости от массы тела ребенка;
- для детей с массой тела от 20 кг до 50 кг рекомендуемая начальная доза составляет 2,5 мг 1 раз в сутки (максимальная суточная доза 20 мг 1 раз в сутки);
- для детей с массой тела более 50 кг рекомендуемая начальная доза составляет 5 мг 1 раз в сутки (максимальная суточная доза 40 мг 1 раз в сутки).

*В случае необходимости применения лизиноприла в дозе 2,5 мг в сутки таблетки Лизиноприл ФТ 5 мг, 10 мг или 20 мг не могут применяться вследствие высокой дозы действующего вещества в одной таблетке и невозможности разделить таблетку на части с дозой действующего вещества 2,5 мг.*

**Если Вы применили большее количество препарата Лизиноприл ФТ, чем следовало**  
Если Вы приняли больше таблеток, чем следует, либо если Ваш ребенок случайно проглотил таблетку/таблетки, обратитесь к врачу или в ближайшее отделение скорой помощи/больницы. По возможности возьмите с собой упаковку с данным лекарственным препаратом и/или данный листок-вкладыш.

При передозировке возможно появление следующих симптомов: головокружение, ощущение сердцебиения.

**Если Вы забыли применить препарат Лизиноприл ФТ**

Если Вы забыли принять дозу препарата, сделайте это, как только вспомните. Однако, если приближается время приема очередной дозы препарата, не принимайте пропущенную дозу. В таком случае примите обычную дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу препарата для восполнения пропущенной.

**Прекращение приема препарата Лизиноприл ФТ**

Важно продолжать принимать препарат до указаний Вашего лечащего врача о прекращении приема. Не прекращайте прием препарата без указаний лечащего врача, даже если Вы чувствуете себя хорошо.

*В случае возникновения дополнительных вопросов по применению лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу.*

**4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно другим лекарственным препаратам Лизиноприл ФТ может вызывать нежелательные реакции, но они возникают не у всех.

**Некоторые нежелательные реакции требуют немедленной медицинской помощи.**  
Если Вы заметили у себя появление каких-либо из следующих симптомов, прекратите применение лекарственного препарата и немедленно обратитесь к врачу:

- Тяжелые аллергические реакции (частота возникновения редко, могут возникать менее чем у 1 из 1000 человек):

- ангионевротический отек (отек гортани, голосовой щели, лица, губ, глотки и/или языка, способный привести к затруднению дыхания вследствие ухудшения проходимости дыхательных путей, к затруднению глотания или к ухудшению способности говорить) (см. подраздел «Особые указания и меры предосторожности при применении»);
- ангионевротический отек конечностей,

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

- анафилактические/анафилактоидные реакции. Возможные проявления: зудящая красная сыпь, сопровождающаяся воспалением кожи (крапивница); иные разновидности сыпи, покраснение или побледнение кожи; спазм бронхов, приводящий к затруднению дыхания; резкое снижение артериального давления, быстрый и слабый пульс; боль в животе, тошнота, рвота или диарея (жидкий стул); головокружение, обморок или предобмороочное состояние.
- Тяжелые поражения кожи (*частота возникновения очень редко, могут возникать менее чем у 1 из 10000 человек*):
  - синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (последнее – более тяжелая форма, при которой возникает обширное отслаивание кожи, захватывающее до 30 и более процентов поверхности тела). Проявления: распространенная сыпь в виде красных пятен, пузырей, болезненных язв, сопровождающаяся шелушением и отслоением кожи и слизистых оболочек; поражаются слизистые оболочки ротовой полости, носа, глаз, половых органов, любые участки кожи; до появления изменений на коже и слизистых оболочках может наблюдаться повышение температуры тела, озноб, боль в горле, головная боль.
  - Нейтропения, агранулоцитоз – снижение уровня определенных видов лейкоцитов в крови (*частота возникновения очень редко, могут возникать менее чем у 1 из 10000 человек*). Нейтропения и агранулоцитоз могут стать причиной инфекционного заболевания, проявляющегося в виде симптомов: повышение температуры тела (лихорадка) и выраженное ухудшение общего самочувствия; повышение температуры тела с местными симптомами инфекционного заболевания, такими как боль в горле или в полости рта; какие-либо проблемы с мочеиспусканием.  
*Если Вы заметили развитие данных симптомов либо других симптомов, которые, по Вашему мнению, указывают на развитие инфекционного заболевания, необходимо как можно скорее обратиться к врачу за консультацией для оценки того, может ли инфекционное заболевание быть следствием применения препарата.*

#### **Другие возможные нежелательные реакции**

##### **Частые нежелательные реакции (*могут наблюдаться менее чем у 1 из 10 человек*):**

- головная боль;
- головокружение;
- ортостатические эффекты (включая гипотензию – снижение артериального давления): чрезмерное падение артериального давления при переходе из горизонтального положения или положения сидя в вертикальное положение может наблюдаться у людей со следующими состояниями: ишемическая болезнь сердца; сужение аорты (артерии сердца), артерий почек или сердечных клапанов; гипертрофическая кардиомиопатия (утолщение сердечной мышцы). Возможные проявления: чувство головокружения, особенно при резком переходе в вертикальное положение;
- непроходящий сухой кашель;
- диарея;
- рвота;
- нарушение функции почек.

##### **Нечастые нежелательные реакции (*могут наблюдаться менее чем у 1 из 100 человек*):**

- изменения настроения;
- нарушения сна (сонливость, бессонница);
- зрительные и/или слуховые галлюцинации;
- парестезия (аномальные ощущения на коже в виде пощипывания, покалывания или жжения);

**СОГЛАСОВАНО**  
 министерством здравоохранения  
 Республики Беларусь  
 Приказ Министерства здравоохранения  
 Республики Беларусь

- вертиго (ощущение движения окружающих предметов вокруг Вас или вращения в пространстве);
- извращение вкуса;
- инфаркт миокарда (сердечный приступ);
- ощущение сердцебиения;
- тахикардия (увеличение частоты сердечных сокращений)
- синдром Рейно. Проявления: изменение цвета пальцев рук или ног ( побледнение, вплоть до синюшности, а затем покраснение), или онемение, или покалывание в пальцах рук или ног;
- острое нарушение мозгового кровообращения (инфаркт);
- ринит (обильные выделения из носа);
- тошнота;
- боль в животе, нарушение пищеварения;
- кожная сыпь, зуд;
- импотенция;
- повышенная утомляемость, астения (непроходящее ощущение усталости);
- изменения в показателях крови, характеризующих работу печени и почек (повышение концентрации мочевины в крови, повышение концентрации креатинина в сыворотке крови, повышение активности печеночных ферментов, гиперкалиемия).

Редкие нежелательные реакции (могут наблюдаться менее чем у 1 из 1000 человек):

- изменения со стороны некоторых клеток или других компонентов крови (снижение гемоглобина, снижение гематокрита). Ваш врач может периодически проводить анализ крови, чтобы выяснить, повлиял ли прием препарата на кровь;
- синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона;
- спутанность сознания;
- нарушения обоняния;
- сухость во рту;
- крапивница (зудящая красная сыпь, сопровождающаяся воспалением кожи);
- алопеция (выпадение волос);
- псориаз (проявления: обильно шелушающиеся папулы (вид сыпи) и бляшки на волосистой части головы, локтях, предплечьях, кистях, коленях, стопах, пояснице и ягодицах);
- уремия (задержка в крови азотистых веществ вследствие нарушения функции почек);
- острые почечные недостаточности;
- гинекомастия (увеличение грудных желез у мужчин);
- повышение концентрации билирубина в сыворотке крови;
- гипонатриемия – низкое содержание натрия в крови (возможные проявления: усталость, головная боль, тошнота, рвота).

Очень редкие нежелательные реакции (могут наблюдаться менее чем у 1 из 10000 человек):

- угнетение функции костного мозга, анемия (снижение уровня гемоглобина и/или количества эритроцитов в крови), тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов – клеток крови, которые помогают останавливать кровотечение), лейкопения (снижение количества лейкоцитов), гемолитическая анемия (заболевание, проявляющееся усиленным разрушением эритроцитов), лимфаденопатия (состояние, проявляющееся увеличением лимфатических узлов), аутоиммунные заболевания;
- гипогликемия (низкий уровень глюкозы в крови). Возможные проявления: чувство голода или слабости, потливость и частое сердцебиение;
- бронхоспазм ( затруднение дыхания, может сопровождаться одышкой, свистящим дыханием);

1482Б-2015

- синусит (возможные проявления: заложенность носа, головная боль в височных и лобных областях);
- аллергический альвеолит/эозинофильная пневмония (воспаление легких). Возможные проявления: кашель, одышка и повышение температуры тела (лихорадка);
- панкреатит (воспаление поджелудочной железы). Возможные проявления: умеренная или сильная боль в животе, нарушения пищеварения, повышение температуры тела;
- ангионевротический отек кишечника (воспаление кишечника);
- гепатит (воспаление печени). Возможные проявления: потеря аппетита, пожелтение кожи и белков глаз, темное окрашивание мочи;
- желтуха (пожелтение кожи или белков глаз);
- печеночная недостаточность (нарушение функции печени);
- потливость;
- пузырчатка (проявления: возникновение на коже и слизистых оболочках булл (пузырей), заполненных жидкостью);
- мультиформная эритема (кожная сыпь, для которой характерно появление пятен в виде небольших мишеней: темная часть в центре окружена более бледной зоной, по контуру бледной зоны образуется темное кольцо; могут образовываться также пятна другого вида, пузырьки и иные изменения кожи);
- доброкачественный лимфаденоз кожи. Проявления: высыпания в виде мелких папул или в виде бляшек различного диаметра, могут сопровождаться судом;
- олигурия/анурия (уменьшение количества отделяемой почками мочи/прекращение выделения мочи).

Частота неизвестна (*частота не может быть оценена по имеющимся данным*):

- депрессивные симптомы;
- обморок;
- симптомокомплекс, который может включать один или несколько из следующих симптомов: лихорадка, васкулит (воспаление кровеносных сосудов), миалгия (боль в мышцах), артрапсия/артрит (боль в суставах/воспаление суставов), положительная реакция на антинуклеарные антитела (АНА), увеличение скорости оседания эритроцитов (СОЭ), эозинофилия и лейкоцитоз (изменения в количестве/составе элементов крови), сыпь, фотосенсибилизация (повышенная чувствительность к солнечному свету и к другим источникам ультрафиолетовых лучей [например, лампы в солярии]) или другие изменения со стороны кожи.

#### Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую в Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» (<https://www.rceth.by/>). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить большие сведений о безопасности препарата.

#### 5. Хранение лекарственного препарата Лизиноприл ФТ

Хранить в защищенном от света и влаги месте при температуре не выше 25°C.  
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 3 года. Срок годности указан на упаковке.

Не использовать после даты, указанной на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

1482Б-2015

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволяют защитить окружающую среду.

#### **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

Препарат Лизиноприл ФТ содержит в качестве действующего вещества лизиноприл (в виде лизиноприла дигидрата).

Лизиноприл ФТ 5 мг: каждая таблетка содержит 5,0 мг лизиноприла (в виде лизиноприла дигидрата).

Лизиноприл ФТ 10 мг: каждая таблетка содержит 10,0 мг лизиноприла (в виде лизиноприла дигидрата).

Лизиноприл ФТ 20 мг: каждая таблетка содержит 20,0 мг лизиноприла (в виде лизиноприла дигидрата).

**Вспомогательные вещества:** крахмал кукурузный, гипромеллоза, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, кальция гидрофосфат безводный.

#### ***Внешний вид лекарственного препарата Лизиноприл ФТ и содержимое упаковки***

Таблетки.

Лизиноприл ФТ 5 мг: таблетки двояковыпуклые белого или почти белого цвета.

Лизиноприл ФТ 10 мг: таблетки двояковыпуклые белого или почти белого цвета.

Лизиноприл ФТ 20 мг: таблетки двояковыпуклые белого или почти белого цвета.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и гибкой упаковки на основе фольги алюминиевой.

Каждые 2, 3 или 6 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

#### ***Условия отпуска из аптек***

По рецепту врача.

***Держатель регистрационного удостоверения и производитель***  
ООО «Фармтехнология»

Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Корженевского, 22.

Телефон/факс: (017) 309 44 88.

E-mail: ft@ft.by

***Данный листок-вкладыш пересмотрен***  
09.2021

<b>СОГЛАСОВАНО</b> МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь
--