

Облепиховое масло суппозитории ректальные 500 мг
Oleum Hippophaes

Перед применением препарата полностью прочтайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или фармацевта.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к фармацевту.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 5 дней вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет Облепиховое масло и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Облепиховое масло
3. Применение препарата Облепиховое масло
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Облепиховое масло
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет Облепиховое масло и для чего его применяют

Облепиховое масло суппозитории относится к группе препаратов для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения. Стимулирует репаративные процессы при поражении слизистой оболочки прямой кишки различной этиологии.

Облепиховое масло суппозитории применяется для лечения геморроя, анальных трещин, эрозивно-язвенных поражений прямой кишки, проктитов, поражений слизистой оболочки нижних отделов толстой кишки после лучевой терапии.

2. О чем следует знать перед применением препарата Облепиховое масло

Не применяйте Облепиховое масло

- если у вас аллергия (гиперчувствительность) на облепиховое масло или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- если у вас диарея;
- если возраст до 6 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата, проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

Без консультации врача не применять препарат дольше установленного срока. Если признаки заболевания не начнут проходить или же, наоборот, состояние здоровья ухудшится, или появятся нежелательные явления, следует обратиться к врачу за консультацией относительно дальнейшего применения препарата.

С осторожностью применять лицам с повышенной чувствительностью и предрасположенным к развитию аллергии.

Применение у пациентов с нарушением функции почек: данные о применении препарата у пациентов с нарушением функции почек отсутствуют.

Применение у пациентов с нарушением функции печени: данные о применении препарата у пациентов с нарушением функции печени отсутствуют.

2485 Б-2022

Применение у пациентов пожилого возраста: данные о применении препарата у пациентов пожилого возраста отсутствуют.

Дети и подростки

Препарат противопоказан к применению в детском возрасте до 6 лет.

Другие препараты и Облепиховое масло

Сообщите лечащему врачу или фармацевту о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Не выявлены взаимодействия с другими лекарственными препаратами.

Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

Облепиховое масло следует применять в период беременности и грудного вскармливания по рекомендации лечащего врача.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат не влияет на способность управлять автотранспортом или потенциально опасными механизмами.

3. Применение препарата Облепиховое масло

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или фармацевта. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

Препарат предназначен для ректального применения. После опорожнения кишечника суппозиторий вводят глубоко в задний проход.

Взрослым и детям старше 12 лет - по 1 суппозиторию 1-3 раза в сутки в течение 7-10 дней.
Детям в возрасте от 6 до 12 лет – по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение 7-10 дней.

Инструкция по ректальному введению лекарственного препарата

При использовании ректальных суппозиториев нередко возникает спазм в животе и позыв к дефекации, поэтому перед процедурой выполните очистительную клизму или опорожните кишечник естественным путем.

Тщательно вымойте руки с мылом. Заранее приготовьте влажные салфетки или носовой платок, смоченный в воде.


Лягте на бок, прижав колени к животу. Для проведения процедуры эта поза наиболее удобна, так как позволяет свести к минимуму неприятные ощущения.

Извлеките суппозиторий из упаковки. Суппозиторий берут большим и средним пальцами правой руки в середине самой широкой части, указательный палец упирается в тупой конец суппозитория. Суппозиторий направляют свободным концом к заднему проходу и проталкивают указательным пальцем в анальный канал до полного погружения на глубину 2-3 см. Проводите процедуру осторожно, не оказывая лишнего давления. Несмотря на то, что суппозиторий имеет обтекаемую форму, при неосторожном использовании можно травмировать слизистую оболочку.

Не вставайте с постели около 20 минут.

Протрите руки заранее приготовленной влажной салфеткой или носовым платком.

Если в течение 10 минут после введения ректального суппозитория произошел позыв к дефекации, опорожните кишечник и введите новый суппозиторий. Если между введением суппозитория и дефекацией прошло больше 10 минут, дополнительная доза лекарства не требуется.



2485 Б-2022

Если вы применили Облепиховое масло больше, чем следовало

Случаи передозировки не описаны.

Если вы применили более высокие дозы, чем вам назначено, обратитесь к лечащему врачу.

Если вы забыли применить Облепиховое масло

Если вы забыли применить Облепиховое масло в рекомендуемое время, то примените ее сразу, как только вспомнили, затем продолжайте по схеме.

Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если вы прекратили применение препарата Облепиховое масло

Прежде чем прервать лечение, проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

- аллергические реакции;
- ощущение жжения, болезненность при длительном применении.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через национальную систему сообщений, сведения о которой опубликованы на веб-сайте республиканского УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Республики Беларусь (Фармаконадзор): www.rceth.by или по электронному адресу: rcpl@rceth.by.

Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности данного препарата.

5. Хранение препарата Облепиховое масло

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.


Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C. Не замораживать.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке после «Годен до...». Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препараты в канализацию. Уточните у фармацевта, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения**Препарат Облепиховое масло суппозитории содержит**

- Активным веществом является облепиховое масло. Каждый суппозиторий содержит 500 мг облепихового масла.
- Прочим ингредиентом является: твердый жир.



2485 Б-2022

Внешний вид препарата Облепиховое масло и содержимое упаковки

Суппозитории цилиндроконической формы, от светло-желтого до темно-оранжевого цвета, с матовой и/или глянцевой поверхностью.

Препарат упакован по 5 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку из ПВХ/ПЭ пленки, по 2 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем в картонную пачку.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

ЗАО «ИНТЕГРАФАРМ»

Республика Беларусь, 223045, Минская область,
Минский р-н, Юзуфоский с/с, 8-5, р-н а/г Юзуфово,
тел. +375 17 504 22 60,
e-mail: office@integrafarm.by

