

БИОТЕСТ

ООО «НПК Биотест», Республика Беларусь

25945 - 2023

**Листок-вкладыш - информация для пациента****Адаптол-БТ, 500 мг, таблетки**
Действующее вещество: темгиколурил

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Адаптол-БТ, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Адаптол-БТ
3. Применение препарата Адаптол-БТ
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Адаптол-БТ
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Адаптол-БТ, и для чего его применяют

Действующим веществом лекарственного препарата Адаптол-БТ является темгиколурил. Препарат устраняет или ослабляет беспокойство, тревогу, страх, внутреннее эмоциональное напряжение и раздражительность. Препарат не снижает умственную и двигательную активность, поэтому его можно применять в течение рабочего дня или учебы.

Показания к применению

Препарат Адаптол-БТ применяется для лечения соматоформной дисфункции вегетативной нервной системы и других невротических расстройств у взрослых.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Адаптол-БТ**Противопоказания****Не принимайте препарат Адаптол-БТ:**

- если у Вас аллергия на темгиколурил или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).



Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Адаптол-БТ проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Получены отдельные сообщения о случаях развития острых реакций повышенной чувствительности.

Дети и подростки

Не давайте препарат детям и подросткам в возрасте до 18 лет, так как данные о безопасности и эффективности у данной группы отсутствуют.

Другие препараты и препарат Адаптол-БТ

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Препарат Адаптол-БТ можно сочетать с нейролептиками, транквилизаторами (бензодиазепинами), снотворными средствами, антидепрессантами и психостимуляторами.

Применение Адаптол-БТ с алкоголем

Не применять Адаптол-БТ с алкогольными напитками.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не рекомендуется принимать препарат Адаптол-БТ во время беременности и в период кормления грудью.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Лекарственный препарат может вызвать понижение артериального давления и слабость, что может повлиять на способность управлять транспортным средством и обслуживать механизмы.

3. Применение препарата Адаптол-БТ

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

Взрослые принимают по 500 мг 2-3 раза в день.

Максимальная разовая доза составляет 3 г, высшая суточная доза – 10 г.

Длительность лечебного курса – от нескольких дней до 2-3 месяцев.

Пациенты пожилого возраста не нуждаются в уменьшении дозы.

Пациентам с нарушениями функции печени дозу снижать не требуется.

У пациентов с нарушениями функции почек коррекция дозы не изучена. У данных пациентов лекарственный препарат следует назначать с осторожностью.



Применение у детей

Безопасность и эффективность препарата Адаптол-БТ у детей и подростков в возрасте до 18 лет на данный момент не установлены.

Путь и способ введения

Препарат Адаптол-БТ принимают внутрь независимо от приема пищи.

Если Вы приняли препарат Адаптол-БТ больше, чем следовало

Лекарственный препарат малотоксичен. Получены два сообщения о случаях передозировки. Однократный прием лекарственного препарата при попытке суицида в дозе 30 г не привел к развитию летального исхода.

Лечение: при передозировке проводят общепринятые методы детоксикации, в том числе промывание желудка, и симптоматическую терапию.

Специфический антидот не известен.

Если Вы забыли принять препарат Адаптол-БТ

Если пропустили прием, примите лекарственный препарат, как только вспомните об этом, но пропустите, если уже почти время следующего приема.

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекратили применение препарата Адаптол-БТ

При наличии вопросов по применению данного препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Адаптол-БТ может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- головокружение
- понижение артериального давления
- нарушение пищеварения
- понижение температуры тела
- слабость
- после приема больших доз препарата возможны аллергические реакции (зуд кожи). В случае аллергической реакции применение лекарственного средства необходимо прекратить.

В случаях понижения артериального давления и/или понижения температуры тела (температура тела может понизиться на 1-1,5 °С) применение лекарственного средства прекращать не надо. Артериальное давление и температура тела нормализуются после окончания курса лечения.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе и на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных



2594Б-2023

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
P1EDP001205/2

препаратов, через www.rceth.by. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата Адаптол-БТ

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от влаги при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Адаптол-БТ содержит

Действующим веществом является темгиколурил.

Каждая таблетка содержит 500 мг темгиколурила.

Прочими вспомогательными веществами являются: метилцеллюлоза, кальция стеарат.

Внешний вид препарата Адаптол-БТ и содержимое упаковки

Таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрические с фаской и риской с одной стороны таблетки.

Риска предназначена лишь для разламывания с целью облегчения проглатывания, а не для разделения на равные дозы.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой лакированной.

2 контурных ячейковых упаковок (20 таблеток) в пачке картонной с вложенной инструкцией по медицинскому применению.

Производитель

АО «Олайнфарм»

Адрес: ул. Рупницу 5, Олайне, LV-2114, Латвия

Держатель регистрационного удостоверения и упаковщик

ООО «НПК Биотест»

Адрес: ул. Гожская 2, г. Гродно, 230014, Республика Беларусь

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

ООО «НПК Биотест»

Адрес: ул. Гожская 2, г. Гродно, 230014, Республика Беларусь

Листок-вкладыш пересмотрен 07/2023

