

**Листок-вкладыш – информация для потребителя
Фурацилин 0,2 мг/мл, раствор для местного и наружного применения
(Нитрофурал (нитрофуразон))**

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат ФУРАЦИЛИН, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата ФУРАЦИЛИН.
3. Применение препарата ФУРАЦИЛИН.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата ФУРАЦИЛИН.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ФУРАЦИЛИН И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Препарат ФУРАЦИЛИН содержит действующее вещество нитрофурал (нитрофуразон), и относится к противомикробному препарату.

Лекарственный препарат ФУРАЦИЛИН применяют:

Наружно для лечения гнойных ран, пролежней, язв, ожогов II и III степени.

Местно для лечения остеомиелита, эмпиемы плевры (скопление гноя в плевральной полости), хронических гнойных отитов и фурункулов наружного слухового прохода, воспаления придаточных пазух носа, острого тонзиллита (воспаление миндалин), стоматита, гингивита (воспаление десен).

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ФУРАЦИЛИН

Не применяйте препарат ФУРАЦИЛИН:

- если у вас аллергия на нитрофурал (нитрофуразон) или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у вас нарушена функция почек;
- если у вас хронические аллергические болезни кожи (аллергодерматозы);
- если у вас кровотечения.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата ФУРАЦИЛИН проконсультируйтесь с лечащим врачом. Препарат применяется только для местного и наружного применения! Могут произойти аллергические реакции.

При применении лекарственного препарата возможно развитие повышенной чувствительности. Чтобы избежать этого рекомендуется использовать лекарственный препарат не более 5 дней.

Если во время применения лекарственного препарата появились зуд, жжение, покраснение или аллергические реакции, немедленно прекратите лечение и обратитесь к врачу за соответствующим лечением.

В случаях применения лекарственного препарата при тяжелых ожогах на больших поверхностях, на фоне нарушения функции почек возможно прогрессирование почечной недостаточности. Тщательное наблюдение за функцией почек рекомендуется в случае, если лекарственный препарат применяется на большие поверхности кожи, в частности в случае тяжелых ожогов.

Использование нитрофурала может вызвать чрезмерный рост грибов или бактерий, не чувствительных к лекарственному препарату, что может привести к развитию вторичной инфекции.

Дети

В связи с тем, что нет достаточных данных о безопасности, лекарственный препарат не должен использоваться детьми и подростками в возрасте до 18 лет.

Другие препараты и препарат ФУРАЦИЛИН

Сообщите лечащему врачу о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

ФУРАЦИЛИН несовместим с:

- эпинефрином (адреналин), тетракаином, прокаином (новокаин), резорцинолом (резорцин) и другими восстановителями;
- перманганатом калия, перекисью водорода и другими окислителями.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Влияния на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с потенциально опасными механизмами не наблюдалось.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ФУРАЦИЛИН

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Способ применения

Применяют местно и наружно.

Рекомендуемая доза

Продолжительность курса лечения по показаниям зависит от характера течения заболевания и места развития патологического процесса.

- *при гайморите*: промывают гайморову полость;
- *при остеомиелите*: промывание полости с последующим наложением влажной повязки;
- *эмпиема плевры*: после удаления гноя проводят промывание плевральной полости и вводят 20-100 мл водного раствора.

Водным раствором ФУРАЦИЛИНА промывают гнойные раны, пролежни и язвы, ожоги II и III степени кожи и слизистых оболочек.

При ангине, стоматите и гингивите: полоскание рта и горла по 100 мл 2-3 раза в день.

При хронических гнойных отитах: 8-10 капель раствора наносят на ватный тампон или турунду и вводят в наружный слуховой проход 2 раза в день. Перед применением раствор следует подогреть до комнатной температуры.

При анаэробной инфекции: помимо обычного хирургического вмешательства, рану обрабатывают раствором ФУРАЦИЛИНА.

При лечении фурункулов наружного слухового прохода и эмпиемы околоносовых пазух: поврежденные участки промывают 2-4-6 раз в день (в зависимости от тяжести повреждения).

Применение у детей

В связи с тем, что нет достаточных данных о безопасности, лекарственный препарат не должен использоваться детьми и подростками в возрасте до 18 лет.

Если вы применили препарата ФУРАЦИЛИН больше, чем следовало

Если вы случайно применили большее количество препарата, чем было рекомендовано, обратитесь к врачу. Врач примет решение о необходимости принятия адекватных мер.

При соблюдении рекомендованных способов применения случаи передозировки неизвестны.

При случайном приеме внутрь лекарственного препарата необходимо вызвать рвоту, за исключением случаев, когда появляются судороги, кома или отсутствует рвотный рефлекс. В таком случае необходимо промывание желудка. При необходимости в дальнейшем возможно использование солевого слабительного.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или медицинской сестре.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат ФУРАЦИЛИН, может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении препарата могут возникнуть следующие нежелательные реакции, которые возникали с частотой «частота неизвестна» (на основании имеющихся данных ее невозможно оценить):

- аллергические реакции;
- зуд кожи, дерматит;
- раздражение слизистой оболочки (при полоскании рта и горла).

В случае возникновения нежелательных реакций рекомендуется прекратить применение препарата и обратиться к врачу за оказанием медицинской помощи.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», www.rceth.by). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности лекарственного препарата.


5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ФУРАЦИЛИН

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Храните в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.



0660Б-2017

Не выливайте препарат в канализацию и не выбрасывайте с бытовыми отходами. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препарата, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

1 мл препарата содержит *действующее вещество*: нитрофурал (нитрофуразон) – 0,2 мг. Прочими *вспомогательными веществами* являются натрия хлорид, натрия гидроксид (в виде 30 % раствора) или хлористоводородная кислота (в виде 0,1 М раствора), вода для инъекций.

Внешний вид препарата ФУРАЦИЛИН и содержимое упаковки
ФУРАЦИЛИН, раствор для местного и наружного применения представляет собой прозрачный раствор желтого цвета.

По 200 мл или 400 мл в бутылках стеклянных.
Для стационаров: 24 бутылки по 200 мл, 12 бутылок по 400 мл упаковывают в пленку полиэтиленовую и вместе с 1-2 инструкциями по медицинскому применению (листочками-вкладышами) помещают в ящики картонные. 20 или 40 бутылок по 200 мл, 12 или 24 бутылки по 400 мл вместе с 1-2 инструкциями по медицинскому применению (листочками-вкладышами) помещают в ящики картонные.

Условия отпуска

Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь,
ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов»,
222603 пос. Альба, ул. Заводская, 1,
Несвижский район, Минская область.
Тел. +375 (1770) 62913.

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:


Республика Беларусь,
ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов»,
222603 пос. Альба, ул. Заводская, 1,
Несвижский район, Минская область.
Тел./ факс +375 (1770) 62061/62073.

Листок-вкладыш пересмотрен:

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: www.rceth.by.

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте www.rceth.by.



**СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ**

ФУРАЦИЛИН, раствор для местного и наружного применения 0,2 мг/мл, представляет собой прозрачный раствор желтого цвета.

Перед применением данного лекарственного препарата необходимо принять во внимание перечисленные ниже рекомендации.

Особые указания и меры предосторожности при применении

Только для местного и наружного применения! Могут произойти аллергические реакции. Возможны так называемые кросс-сенсibilизации, если были аллергические реакции на любые лекарственные препараты из класса нитрофуранов. Чтобы избежать сенсibilизации рекомендуется использовать лекарственный препарат не более 5 дней. Если во время применения лекарственного препарата появились признаки раздражения в месте применения (зуд, жжение, покраснение) или аллергические реакции, лечение должно быть немедленно прекращено и начато соответствующее лечение. В случаях применения лекарственного препарата при тяжелых ожогах на больших поверхностях, на фоне нарушения функции почек возможно прогрессирование почечной недостаточности (уремия, нарушение водно-электролитного баланса и метаболический ацидоз). Тщательный мониторинг функции почек рекомендуется в случае, если лекарственный препарат применяется на большие поверхности кожи, в частности в случае тяжелых ожогов. Использование нитрофураля может привести к чрезмерному росту грибов или бактерий, не чувствительных к лекарственному препарату, которые могут привести к развитию вторичной инфекции.

Режим дозирования и способ примененияРежим дозирования.

Орошают раны и накладывают влажные повязки. Внутриполостно: при гайморите – промывают гайморову полость; при остеомиелите – промывание полости с последующим наложением влажной повязки; эмпиема плевры – после удаления гноя проводят промывание плевральной полости и вводят 20-100 мл водного раствора. Водным раствором фурацилина промывают гнойные раны, пролежни и язвы, ожоги II и III степени кожи и слизистых оболочек. Лекарственный препарат используют для орошения гранулирующей поверхности при подготовке к пересадкам кожи.

При ангине, стоматите и гингивите – полоскание рта и горла по 100 мл 2-3 раза в день.

При хронических гнойных отитах 8-10 капель раствора фурацилина наносят на ватный тампон или турунду и вводят в наружный слуховой проход 2 раза в день. Перед применением раствор следует подогреть до комнатной температуры.

При анаэробной инфекции, помимо обычного хирургического вмешательства, рану обрабатывают раствором фурацилина.

Раствор фурацилина используют при лечении фурункулов наружного слухового прохода и эмпиемы околоносовых пазух. Поврежденные участки промывают 2-4-6 раз в день (в зависимости от тяжести повреждения).

Особые группы пациентов.

Дети.

В связи с тем, что нет достаточных данных о безопасности, лекарственный препарат не должен использоваться детьми и подростками в возрасте до 18 лет.

Способ применения.

Применяют местно и наружно. Продолжительность курса лечения по показаниям зависит от характера течения заболевания, локализации патологического процесса.

Пожалуйста, за дополнительной информацией обратитесь к ОХЛП (общей характеристике лекарственного препарата).

<https://www.rceth.by>

19.10.2023

