



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
лекарственного средства
ФУРАЦИЛИН
(FURACILINUM)

Прочтите внимательно этот Листок-вкладыш перед тем, как начать применение препарата!

Внимательно прочтайте весь Листок-вкладыш перед тем, как начать прием/использование этого лекарственного средства, так как он содержит важную для Вас информацию. Для достижения оптимальных результатов лекарственное средство следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в листке-вкладыше (инструкции).

Сохраните этот Листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его снова.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.

Этот препарат предназначен лично для Вас и не следует передавать его другим лицам. Это может навредить им, даже если симптомы их заболевания схожи с теми, которые наблюдаются у Вас.

Торговое название препарата: Фурацилин.

Международное непатентованное название: нитрофурал.

Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки желтого или зеленовато-желтого цвета с неравномерной окраской поверхности с фаской и риской.

Состав на 1 таблетку:

Активное вещество: нитрофурал (фурацилин) (в пересчете на 100 % вещество) - 20 мг

Вспомогательное вещество: натрия хлорид.

Форма выпуска: таблетки для приготовления раствора для местного и наружного применения.

Фармакотерапевтическая группа: Антисептики и дезинфицирующие средства.

Производные нитрофурана. Нитрофурал.

Код ATX: D08AF01.

Показания к применению

Наружно: гнойные раны, пролежни, ожоги II-III ст., мелкие повреждения кожи (в т.ч. ссадины, царапины, трещины, порезы).

Местно: острый тонзиллит, стоматит, гингивит.

Способ применения и дозировка

Фурацилин применяют местно и наружно, в виде водного 0,02 % раствора. Для приготовления водного раствора 1 таблетку (20 мг) растворить в 100 мл дистиллированной

или кипяченой воды (для быстрого растворения использовать горячую или кипящую воду). После этого раствор охладить до комнатной температуры.

Риска предназначена для разламывания таблетки с целью более быстрого растворения, а не разделения на равные дозы.

Наружно: При гнойных ранах, пролежнях, ожогах II и III степени, мелких повреждениях кожи – орошают раны водным 0,02 % раствором и накладывают влажные повязки.

Местно: При остром тонзиллите, стоматите, гингивите – полоскание рта и горла теплым водным 0,02 % раствором по 100 мл 2-3 раза в день.

Продолжительность лечения – по показаниям в зависимости от характера и локализации пораженного участка.

Побочное действие

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Возможны аллергические ~~реакции~~ при ~~наружном~~ применении – зуд кожи, дерматиты, требующие временного перерыва или прекращения применения препарата.

Если любые из указанных в листке-вкладыше побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в листке-вкладыше, сообщите об этом Вашему врачу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к нитрофуралу, производным нитрофурана и/или другим компонентам препарата, кровотечение, аллергодерматозы, выраженные нарушения функции почек.

Передозировка

При соблюдении рекомендованных способов применения случаи передозировки не известны.

Меры предосторожности

В случае возникновения каких-либо необычных реакций обязательно посоветуйтесь с врачом относительно дальнейшего применения препарата.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно по рекомендации врача.

Применение в детской практике

Информация о применении препарата в детском возрасте отсутствует.

Применение у пожилых людей

Нет необходимости корректировать дозу в зависимости от возраста.

Применение у лиц с нарушенной функцией печени

Информация об опыте применения у лиц с нарушенной функцией печени отсутствует.

8214 - 2021

Применение у лиц с нарушенной функцией почек

Информация об опыте применения у лиц с нарушенной функцией почек отсутствует.

Влияние лекарственного средства на способность управлять автомобилем или механизмами

Препарат не оказывает отрицательного влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами и т.п.).

Взаимодействие фурацилина с другими лекарственными препаратами не выявлено.

Условия хранения и срок годности

В защищенном от света и влаги месте при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Готовый раствор можно хранить в течение 14 дней в хорошо закупоренных банках из темного стекла, в прохладном (8-15 °C) и защищенном от света месте.

5 лет. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта.

Упаковка

Таблетки для приготовления раствора для местного и наружного применения 20 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку.

1 контурную ячейковую упаковку вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Производитель

АО "Татхимфармпрепараты", Россия

420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

тел.: (843) 571-85-58; факс: 571-85-38

e-mail: marketing@tatpharm.ru

Зам. генерального директора
АО "Татхимфармпрепараты"

И.Р.Абдуллин

