

3304 - 2014

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от 25.02.14 № 142

Дисменорм
Таблетки

Листок-вкладыш. Информация для пациенток

Внимательно прочтите этот листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данное лекарственное средство!

Сохраните этот листок-вкладыш, возможно, Вам потребуется прочитать его снова. Более подробную информацию Вы сможете получить у Вашего врача или фармацевта. Если сочтете необходимым, обратитесь к ним за советом.

Общие физико-химические свойства

Белые или почти белые плоские таблетки с фаской, допускается незначительная крапчатость.

Состав

1 таблетка (250 мг) содержит:

активные вещества: Vitex Agnus castus (витекс священный) Ø 125 мг (сухой остаток 1,0 мг), Apis mellifica (пчела медоносная) трил. D3 25 мг, Pulsatilla pratensis (прострел луговой) трил. D3 25 мг, Rosmarinus officinalis (розмарин лекарственный) трил. D2 25 мг.

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал пшеничный, магния стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство.

Прочие лекарственные средства, применяемые в гинекологии.

Фармакологические свойства

Дисменорм является комбинированным средством, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав. Он применяется в комплексном лечении нарушений менструального цикла и проявлений предменструального синдрома.

Фармакокинетика

Гомеопатический метод лечения существенно отличается от традиционной медицины. Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

Показания к применению

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Традиционно применяется в комплексном лечении нарушений менструального цикла и проявлений предменструального синдрома.

Противопоказания

Эстроген-зависимые опухоли и опухоли гипофиза. Индивидуальная непереносимость (повышенная чувствительность) на пчелиный яд, пшеничный крахмал или любой из компонентов лекарственного средства.

Детский возраст до 18 лет.

Период лактации.

Лекарственное средство не предназначено для применения в период беременности.

Меры предосторожности

При наличии нарушений менструального цикла следует обратиться к врачу для уточнения диагноза.

Следует обратиться за консультацией к врачу в следующих случаях

- при отсутствии улучшения или ухудшении состояния
- в случае возникновения дополнительных жалоб.
- Лекарственное средство содержит пшеничный крахмал, поэтому пациентам с повышенной чувствительностью или непереносимостью глютена не следует его применять.
- Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача для уточнения диагноза и исключения эстрогенчувствительных опухолей и опухолей гипофиза.

Гомеопатические лекарственные средства не должны применяться в течение длительного времени без консультации врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Вследствие возможной допаминергической и эстрогенной активности действующего вещества Vitex Agnus castus (витекс священный), вероятно взаимодействие лекарственного препарата с препаратами агонистами и антагонистами допаминовых рецепторов, препаратами эстрогенов и антиэстрогенов.

При приеме в настоящее время, или приеме ранее, каких бы то ни было лекарственных препаратов, рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Прием в период беременности и лактации

Препарат Дисменорм не показан к применению в период беременности.

Не следует применять в период лактации, так как действующим веществом препарата является Vitex Agnus castus (витекс священный).

Влияние на способность вождения автотранспорта и работы со специальным оборудованием

Препарат Дисменорм не оказывает воздействия на способность управления автотранспортом или работу с другими механизмами.

Информация о вспомогательных веществах

В составе препарата Дисменорм содержится пшеничный крахмал. Пациентам, страдающим аллергическими реакциями на белки пшеницы (отличные от целиакии), принимать препарат не следует.

В составе препарата Дисменорм содержится лактоза (молочный сахар). Если врач сообщал вам о наличии непереносимости каких-либо видов сахаров, перед началом приема лекарственного средства следует проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Если не назначено иначе, Дисменорм следует принимать следующим образом:

при выраженных симптомах следует принимать по 1 таблетке каждые полчаса-час (до 6 раз в сутки). Увеличение суточной дозы и увеличение длительности приема более одной недели может осуществляться только после консультации с врачом.

При хронических состояниях следует принимать по 1 таблетке 1-3 раза в день.


По мере улучшения состояния частота приема должна быть уменьшена.

Продолжительность приема лекарственного средства определяет врач.

Таблетки следует принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им медленно раствориться в полости рта.

Передозировка

Неблагоприятные явления в случаях передозировки препарата Дисменорм до настоящего времени не известны.



Побочные действия

Как и любое другое лекарственное средство, данный препарат может вызывать побочные явления, хотя наблюдаются они не у всех.

Частота развития побочных эффектов не может быть определена по имеющимся данным. При приеме лекарственных препаратов, содержащих Vitex Agnus castus (витекс священный), возможны такие явления, как головная боль, головокружения, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, такие, как тошнота и абдоминальная боль, угревая сыпь и нарушения менструального цикла. Есть также сообщения о случаях реакций гиперчувствительности, проявляющихся в виде кожных высыпаний, крапивницы (образование зудящих волдырей), и даже реакций высокой степени тяжести, сопровождающихся отеком лица, одышкой (диспноэ) и затрудненностью глотания.

В случае любого побочного явления следует обратиться к врачу или фармацевту. Это касается и любых побочных явлений, не указанных в настоящем листке-вкладыше.

Примечание: При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное ухудшение имеющихся симптомов заболевания (первоначальное ухудшение). В подобных случаях пациентам следует прекратить прием препарата и обратиться за консультацией к врачу.

Срок годности

5 лет.

Не применяйте Дисменорм после даты истечения срока годности, указанной на упаковке.

Хранение

Хранить в оригинальной упаковке при температуре 15–25 °C в недоступном для детей месте.

Упаковка и содержимое

Таблетки.

По 80 таблеток во флаконе из коричневого стекла с пластмассовой навинчивающейся крышкой. По 1 флакону пакуют в коробку вместе с листком-вкладышем.

Категория отпуска.

Отпускается без рецепта.

Производитель

Дойче Хомеопати-Унион
ДХУ-Арцнаймиттель ГмБХ & Ко. КГ
Германия, 76227 Карлсруэ,
Оттоштрассе 24
Тел. +49 (721) 40 93 236

Deutsche Homoopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Germany, Karlsruhe 76227
Ottostrasse 24
tel. +49 (721) 40 93 236

СОГЛАСОВАНО МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь
--