

Информация для пациентов

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ВИТРУМ® ПРЕНАТАЛ ФОРТЕ

Регистрационный номер: П N012053/01 от 29.07.2010

Торговое название препарата: ВИТРУМ® ПРЕНАТАЛ ФОРТЕ

МНН или группировочное название: Поливитамины+Минеральные соли&

Лекарственная форма: таблетки покрытые пленочной оболочкой


СОСТАВ: одна таблетка покрытая пленочной оболочкой содержит:

Активные действующие вещества:

Бетакаротен	1500 мкг ¹⁾
Ретинола ацетат (Витамин А)	860 мкг ²⁾
Колекальциферол (Витамин D ₃)	10 мкг ³⁾
Альфа-токоферола ацетат (Витамин Е)	30 мг ⁴⁾
Аскорбиновая кислота (Витамин С)	120 мг
Тиамин мононитрат (Витамин В ₁)	3 мг
Рибофлавин (Витамин В ₂)	3,4 мг
Пиридоксина гидрохлорид (Витамин В ₆)	10 мг
Никотинамид	20 мг
Цианокобаламин (Витамин В ₁₂)	12 мкг
Фолиевая кислота	800 мкг
Биотин	30 мкг
Кальция пантотенат в пересчете на пантотеновую кислоту	10 мг
Кальция карбонат в пересчете на кальций	200 мг
Магния оксид в пересчете на магний	25 мг
Железа fumarat в пересчете на железо	60 мг
Меди оксид в пересчете на медь	2 мг
Цинка оксид в пересчете на цинк	25 мг
Марганца сульфат в пересчете на марганец	5 мг
Хрома хлорид в пересчете на хром	25 мкг
Натрия молибдат в пересчете на молибден	25 мкг
Натрия селенат в пересчете на селен	20 мкг
Калия йодид в пересчете на йод	150 мкг

1) эквивалентно 2500 МЕ Бетакаротена

2) эквивалентно 2500 МЕ Витамина А



- 3) эквивалентно 400 МЕ Витамина D₃
- 4) эквивалентно 30 МЕ Витамина E

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, стеариновая кислота, кроскармеллоза натрия, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный.

Оболочка: гипромеллоза, титана диоксид, триацетин, краситель бриллиантовый черный (E151), краситель красный очаровательный (E129).

ОПИСАНИЕ

Таблетки капсуловидной формы, покрытые пленочной оболочкой от светло-серого до темно-серого цвета, с гравировкой «PRENATAL» с одной стороны и «FORTE» с другой стороны таблетки, со специфическим запахом.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: поливитаминное средство+минералы

КОД АТХ: [A11AA04]

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Определяются свойствами витаминов и минералов, входящих в состав препарата. Препарат обеспечивает восполнение дефицита витаминов и минеральных веществ в организме женщины в период подготовки к беременности, во время беременности и в период грудного вскармливания.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- профилактика гиповитаминозов и недостатка минеральных веществ в период подготовки к беременности, во время беременности и в период грудного вскармливания;
- профилактика железодефицитной анемии у беременных, дефицита кальция в организме матери.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Не рекомендуется использовать при гипervитаминозе A и D, избыточном накоплении железа в организме, повышенном содержании кальция в крови, повышенном выделении кальция с мочой и при мочекаменной болезни.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Рекомендуется женщинам на этапе планирования беременности, в период беременности и после родов принимать внутрь по одной таблетке в день после завтрака, запивая водой. Курс приема препарата не более 1-2 месяцев.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможны аллергические реакции на компоненты препарата. Возможно окрашивание мочи в интенсивный желтый цвет, что не представляет опасности, так как обусловлено наличием рибофлавина в составе препарата.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Симптомы передозировки: тошнота, слабость, нарушение зрения, желудочно-кишечные расстройства.

При случайной передозировке обратиться к врачу.

Лечение: активированный уголь внутрь, промывание желудка, симптоматическое лечение.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Препарат содержит железо и кальций и поэтому может задерживать всасывание в кишечнике антибиотиков из группы тетрациклинов, а также противомикробных средств - производных фторхинолонов. Витамин С усиливает действие и побочные эффекты противомикробных средств из группы сульфаниламидов (в том числе, появление кристаллов в моче). Антацидные препараты, содержащие алюминий, магний, кальций, а также колестирамин, уменьшают всасывание железа. При одновременном назначении мочегонных средств из группы тиазидов увеличивается вероятность гиперкальциемии.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не превышать рекомендуемую дозу.

Не рекомендуется использовать «Витрум® Пренатал Форте» совместно с препаратами, содержащими витамины А и D, во избежание передозировки.

Рекомендован контроль биохимического анализа крови для предупреждения избыточного накопления железа, повышения уровня кальция в крови и его избыточного выделения с мочой.

С осторожностью применять лицам с почечной недостаточностью и тяжелыми поражениями печени.


ФОРМА ВЫПУСКА

Таблетки покрытые пленочной оболочкой

По 30, 60, 100 или 120 таблеток во флакон из полиэтилена с завинчивающейся полиэтиленовой крышкой и предохранительным клапаном из фольги. На флакон наклеивают этикетку, флакон затягивают полиэтиленовой пленкой и вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В сухом месте, при температуре 10-30°C.



Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет.

Не следует принимать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.



УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Юнифарм, Инк., США

Претензии направлять в адрес:

Представительство в России: 113114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 5,
тел: (495) 995-77-67, www.unipharm.ru