


АНУЗОЛ-М

Суппозитории ректальные



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Прочтите внимательно листок-вкладыш перед тем, как начать применение лекарственного средства!

Сохраняйте этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.

Этот препарат назначается лично Вам и не следует рекомендовать его другим лицам. Это может навредить их здоровью, даже если симптомы их заболеваний схожи с теми, которые наблюдаются у Вас.

Торговое название: АНУЗОЛ-М.

Описание: суппозитории желтого цвета с коричневатым или зеленоватым оттенком, с запахом ксероформа. Допускается появление едва заметного белого налета на поверхности суппозитория.

Состав лекарственного средства:

1 суппозиторий содержит:

действующее вещество: ксероформа 0,10 г, белладонны экстракт густой, водно-спиртовой ((4,8-5,2):1), (экстрагент 20% (об/об) этанол) экстракт, который содержит не менее 1,3 % суммы алкалоидов, в перерасчете на гиосциамин (атропин-основание) и сухое вещество – 0,02 г, цинка сульфата 0,05 г;

вспомогательное вещество: глицерин дистиллированный, твердый жир.

Лекарственная форма. Суппозитории ректальные.

Фармакотерапевтическая группа.

Средство для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения
Фармакологические свойства. Свойства Анузола-М обусловлены эффектами ингредиентов, входящих в его состав, в частности антисептическими, вяжущими, подсушивающими, спазмолитическими, болеутоляющими, что способствует заживлению ран слизистой оболочки прямой кишки. При введении суппозитория в прямую кишку эффект препарата проявляется через 15-90 мин. Длительность резорбтивного действия алкалоидов колеблется от 2 до 6 час.

Показания к применению.

Геморрой, трещины заднего прохода у взрослых.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Мерцательная аритмия, тахикардия, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, митральный стеноз, тяжелая артериальная гипертензия. Острое кровотечение. Тиреотоксикоз. Гипертермический синдром, заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся непроходимостью (ахалазия пищевода, стеноз привратника, атония кишечника). Глаукома. Печеночная и почечная недостаточность. Миастения gravis. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Дети до 18 лет. Беременность и лактация. Язвенный колит в стадии обострения.

Предостережение при применении.

Перед началом лечения посоветуйтесь с врачом!

С осторожностью применяя пациентам с гиперплазией предстательной железы без обструкции мочевыводящих путей, синдромом Дауна, детским церебральным параличом; при рефлюкс-эзофагите; грыже пищеводного отверстия диафрагмы, сочетающейся с рефлюкс-эзофагитом; неспецифическом язвенном колите; заболевания почек; мегаколоне; ксеростомии; пациентам пожилого возраста или ослабленным пациентам; при хронических заболеваниях легких, протекающих с низкой продукцией густой мокроты, которая трудно отделяется, особенно у ослабленных пациентов; при вегетативной (автономной) нейропатии; повышение температуры тела (вероятность лихорадки и теплового удара вследствие подавления активности потовых желез).

Применение в период беременности или кормления грудью.

Противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Учитывая возможность появления таких побочных реакций, как головокружение, галлюцинации, нарушение аккомодации, при применении препарата следует воздержаться от управления автотранспортом или работы с механизмами.

Дети.

Не использовать.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Если Вы принимаете какие-нибудь другие лекарственные средства, обязательно проконсультируйтесь с врачом по поводу возможности применения препарата.

При применении препарата с ингибиторами МАО возможно возникновение сердечной аритмии, с хинидином, новокаиномидом - синергизм холинолитического эффекта, с препаратами ландыша, с танином наблюдается физико-химическое взаимодействие, что приводит к взаимному ослаблению эффектов. Анузол-М возможно уменьшает продолжительность и глубину воздействия наркотических средств, ослабляет действие опиатов. При одновременном применении с димедролом или дипразином возможно усиление атропиноподобного действия экстракта белладонны; с нитратами, галоперидолом, кортикостероидами для системного применения - возможно возрастает вероятность повышения внутриглазного давления; с сертралином - усиливается депрессивный эффект обоих препаратов; с спиронолактоном, миноксидилом - снижается эффект спиронолактона и миноксидила; с пенициллинами - усиливается эффект обоих препаратов; с низатином - усиливается действие низатида; с кетоконазолом - уменьшается всасывание кетоконазола; с аскорбиновой кислотой и аттапульгитом - снижается действие Анузола-М; с пилокарпином - снижается эффект пилокарпина при лечении глаукомы; с окспренолоном - снижается антигипертензивный эффект препарата. Под действием Октадина возможно уменьшение гипосекреторного действия препарата, ослабляет действие М-холиномиметиков и антихолинэстеразных средств. При одновременном применении с сульфаниламидными препаратами возрастает риск поражения почек, с препаратами, содержащими калий - возможно образование язв кишечника, с НПВП - риск образования язв желудка и кровотечений. Действие Анузола-М может усиливаться при одновременном применении других препаратов с антимукарбиновым эффектом: М-холиноблокаторов, противопаркинсонических препаратов (амантадин), спазмолитиков, некоторых антигистаминных средств, препаратов группы бутирофенона, фенотиазинов, хинидина и трициклических антидепрессантов, неселективных ингибиторов обратного захвата моноаминов.

Угнетение перистальтики под действием Анузола-М может привести к изменению всасывания других лекарственных средств.

Способ применения и дозы.

Ректально, после очистительной клизмы или самостоятельного опорожнения кишечника. По 1 суппозиторию 2-3 раза в день. Максимальная суточная доза - 7 суппозиторияев. Обычно длительность курса лечения составляет 7-10 дней.

Передозировка.

Симптомы: усиление проявлений побочных реакций, тошнота, рвота, снижение артериального давления, возбуждение, тремор, судороги, бессонница, сонливость, галлюцинации, раздражительность, гипертермия. Угнетение ЦНС, угнетение активности дыхательного и сосудодвигательного центров, задержка мочеиспускания, гипертермия. В случае передозировки следует немедленно обратиться к врачу.

Лечение. Промывание желудка, парентеральное введение холиномиметиков и антихолинэстеразных средств. При гипертермии показаны влажные обтирания и жаропонижающие средства, при возбуждении - введение тиопентала натрия или оксibuтирата натрия при мидриазае - местно в виде глазных капель фосфакол, физостигмин, пилокарпин. В случае развития приступа глаукомы немедленно в конъюнктивальный мешок закапывают 1 % раствор пилокарпина каждый час по 2 капли и подкожно вводят 1 мл 0,05 % раствора прозерина 3-4 раза в сутки.

Побочное действие.

Частота возникновения возможных побочных эффектов, перечисленных ниже, не известна. *ЖКТ:* сухость во рту, жажда, нарушение вкусовых ощущений, дисфагия, уменьшение моторики кишечника до атонии, уменьшение тонуса желчевыводящих путей и желчного пузыря, запор, диарея.

Со стороны почек и мочевыводящих путей: затруднение и задержка мочеиспускания.

Кардиальные расстройства: тахикардия, ощущение сердцебиения; аритмия; включая экстрасистолия; ишемия миокарда.

Сосудистые расстройства: покраснение лица, приливы.

Неврологические расстройства: головная боль, головокружение, нервозность, бессонница.

Со стороны органов зрения: расширение зрачков, фотофобия, паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления, временные расстройства зрения.

Со стороны дыхательной системы и органов средостения: образование вязкой мокроты, которая тяжело откашливается.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: в том числе кожные высыпания, крапивница, эксфолиативный дерматит.

Со стороны иммунной системы: в том числе анафилактические реакции, анафилактический шок.

Другие: уменьшение потоотделения, сухость кожи, дизартрия, жжение в области заднего прохода. В случае появления каких-либо нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

Срок годности.

2 года.

Не применять лекарственное средство после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 8 °С до 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 5 суппозиторияев в стрипе. По 2 стрипа вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

ПД ГВ

6894 - 2018

Правила отпуска. Без рецепта.

Название и адрес производителя.

ПАО "Монфарм", Украина, 19100 Черкасская обл., г. Монастырище, ул. Заводская, 8.