

НД РБ

4638 - 2018

Листок-вкладыш лекарственного средства



Уважаемый пациент,

Внимательно прочитайте инструкцию перед приемом препарата.
Сохраните инструкцию, возможно, Вам потребуется перечитать ее снова.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.

Мастодинон®

Лекарственное средство при мастопатии, предменструальном синдроме, нарушениях менструального цикла

Лекарственная форма

Таблетки

Состав

1 таблетка Мастодинон® содержит:

Vitex agnus castus ø (Витекс священный или Авраамово дерево)	162.0 мг
Caulophyllum thalictroides D4 (Стеблелист василистниковидный)	81.0 мг
Cyclamen purpurascens D4 (Цикламен европейский)	81.0 мг
Strychnos ignatia D6 (Чилибуха игнация)	81.0 мг
Iris versicolor D2 (Ирис разноцветный)	162.0 мг
Lilium tigrinum D3 (Лилия тигровая)	81.0 мг

Вспомогательные вещества: лактоза моногидрат, картофельный крахмал, магния стеарат.

Описание

Таблетки бежевого цвета, круглые с плоской поверхностью, возможна незначительная пигментация

Производитель:

БИОНОРИКА СЕ
Кершенштайнерштрассе 11-15,
92318 Ноймаркт
Телефон: 09181 231-90
Факс: 09181 231-265
Интернет: www.bionorica.de

Представительство в Республике Беларусь
220095 г. Минск, пр. Рокоссовского 64, пом.2 Н
тел/факс (+375 17) 342-40-08, 271-40-13
e-mail office@bionorica.by

Показания к применению


Гомеопатическое лекарственное средство.
Область в рамках гомеопатического применения включает комплексную терапию:

- мастопатии;
- предменструального синдрома (болезненное напряжение молочных желез, психическая лабильность, запоры, отеки, головная боль/мигрень);
- нарушений менструального цикла.

Если симптомы сохраняются или повторяются периодически, или появляются симптомы неясного происхождения, следует проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства



Предостережения и меры предосторожности

Пациентки, имеющие в анамнезе диагноз эстроген-чувствительная опухоль должны перед приемом препарата предварительно проконсультироваться с врачом.

Пациентки, принимающие допаминовые агонисты, допаминовые антагонисты, эстрогены и антиэстрогены должны перед приемом препарата предварительно проконсультироваться с врачом.

Мастодинон® не назначается детям и подросткам младше 12 лет.

Мастодинон® не должен назначаться до наступления регулярных менструаций в период полового созревания.

Если во время приема наблюдается ухудшение симптоматики, следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Пациентки с болезнями гипофиза в анамнезе должны проконсультироваться с врачом перед применением препарата Мастодинон®.

В состав лекарственного препарата входит лактоза. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или мальабсорбцией глюкозы-галактозы не следует принимать данный препарат.

Примечание для больных сахарным диабетом:

1 таблетка содержит около 0,020 хлебных единиц (ХЕ).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

В связи с возможными допаминэргическими и эстрогенэргическими эффектами *Vitex agnus castus*, взаимодействие с допаминовыми агонистами, допаминовыми антагонистами, эстрогенами и антиэстрогенами не может быть исключено.

Применение в период беременности и кормления грудью

Мастодинон® не назначается во время беременности. Данные исследований показывают, что *Vitex agnus castus* может влиять на лактацию.

Мастодинон® таблетки противопоказаны к применению в период беременности и кормления грудью.

Влияния на способность управлять автомобилем или механизмами

Лекарственное средство в рекомендованной дозировке не влияет на способность управлять автомобилем или механизмами.

Способ применения и дозы

Внутрь. Если врачом не предписано иное, следует принимать по 1 таблетке 2 раза в день утром

4638 - 2018

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

и вечером.

Таблетку следует проглатывать целиком, не разжёвывая, запивая небольшим количеством воды.

Гомеопатические препараты не следует принимать длительное время без консультации врача.

Побочное действие

Сообщалось об острых аллергических реакциях с отеком лица, одышкой, затруднением глотания; аллергических кожных реакциях (таких как, сыпь, крапивница); головной боли, головокружении; акне; гастроинтестинальных расстройствах (таких как, тошнота, абдоминальные боли); возможны нарушения менструального цикла. Частота не известна.

В случае первых признаков аллергической реакции прекратить применение таблеток Мастодинон®.

При появлении побочного действия, включая эффекты, не описанные в данной инструкции, пожалуйста, обратитесь к врачу.

Примечание:

На фоне применения гомеопатических средств возможно временное обострение симптоматики (гомеопатическое обострение). В этом случае необходимо прекратить прием препарата и обратиться за консультацией к врачу.

Передозировка

Если было принято большое количество лекарственного средства, у пациентов с редкой непереносимостью лактозы, может возникнуть нарушение со стороны желудочно-кишечного тракта или диарея.

В случае употребления препарата в дозах, превышающих терапевтические, необходимо проводить симптоматическое лечение.

Срок годности

4 года.

Не применять после окончания срока годности!

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Форма выпуска

По 20 таблеток в блистер. По 3 блистера вместе с инструкцией по применению в картонную коробку.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача