

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению препарата**  
**(информация для потребителей)**

**КОРНЕРЕГЕЛЬ**  
**гель глазной 50мг/г**

**Регистрационный номер:**

**Международное (непатентованное) название:** Декспантенол  
**Химическое название:** (R) -2,4-диокси- N -(3-гидроксипропил) -3,3-диметил -бутирамид.

**Лекарственная форма:** гель глазной.

**Состав (на 1 г геля):**

Активные вещества:

Декспантенол - 50.0 мг

Вспомогательные вещества:

Цетримид, динатрия эдетат, карбомер, натрия гидроксид, вода для инъекций.

**Описание:** прозрачный или слегка опалесцирующий бесцветный легко текучий гель.

**Фармакотерапевтическая группа:** прочие офтальмологические средства.

Код АТХ: S01XA12

**Фармакологическое действие:**

Протектор роговицы. Стимулирует процессы регенерации роговицы. Оказывает противовоспалительное действие.

**Фармакокинетика:**

Карбомер не проникает в ткани глазного яблока вследствие высокой молекулярной массы и не абсорбируется в системный кровоток. Карбомер увеличивает продолжительность контакта водного раствора с эпителием роговицы, тем самым пролонгируя действие декспантенола.

**Показания к применению:**

- эрозии роговицы;
- ожоги глаз;
- кератиты различной этиологии;
- дистрофические заболевания роговицы;
- профилактика повреждений роговицы при ношении контактных линз.


При лечении инфекций роговицы бактериальной, вирусной или грибковой этиологии препарат применяется в качестве вспомогательного средства, сопровождающего основное лечение.

**Противопоказания:**

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.  
 Следует использовать с осторожностью у пациентов с хронической почечной недостаточностью, а также при беременности и в период лактации.

**Способ применения и дозы:**

Закапывают по 1 капле 3-5 раз в сутки, в зависимости от тяжести и выраженности жалоб.



**Побочные эффекты:**

Аллергические реакции, преходящее "затуманивание" зрения, ощущение жжения, местное раздражение глаз.

**Передозировка:**

Данные по передозировке препарата отсутствуют.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

В тех случаях, когда проводится дополнительная местная терапия, интервал между введением Корнерегеля и других препаратов должен составлять не менее 5 минут. Корнерегель следует применять последним.

**Особые указания:**

В период лечения препаратом не рекомендуется ношение мягких контактных линз. При использовании контактных линз следует снять их перед закапыванием и вновь одеть через 15 минут после инстилляцией препарата.

В период лечения необходимо воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Тубу необходимо закрывать после каждого использования. Не следует прикасаться кончиком пипетки к глазу.

**Применение в детском возрасте**

У детей препарат применяется по назначению и под контролем врача.

**Форма выпуска:**

Глазной гель в тубах по 5 г.

1 туба вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной упаковке.

**Срок годности:**

2 года. После вскрытия тубы препарат следует использовать в течение 6 недель.

Не использовать после срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения:**

Список Б. При температуре не выше 25° С, в защищенном от света, недоступном для детей месте.

**Условия отпуска из аптек:**

Без рецепта.

**Производитель:**

Доктор Герхард Манн

химико-фармацевтическое предприятие ГмбХ, Германия

Д- 13581 Берлин, Брунсбюттелер Дамм, 165-173