


ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ К ПОТРЕБИТЕЛЮ

НАЗВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Миррамил



ФОРМА ВЫПУСКА

Спрей для слизистой ротовой полости

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Коричневого цвета, горького вкуса жидкость с характерным запахом. При хранении возможно выпадение осадка.

СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

1 мл спрея содержит 0,10 мл настойки из смолы Мирры (*Commiphora molmol*) 1:5 (экстрагент 90 % об/об этанол), 0,35 мл жидкого экстракта из цветков Ромашки аптечной (*Matricaria recutita*) 1:1 (экстрагент 50 % об/об этанол), 0,05 мл настойки из листьев Эвкалипта шаровидного (*Eucalyptus globulus*) 1:5 (экстрагент 70 % об/об этанол), 0,30 мл настойки из листьев Шалфея лекарственного (*Salvia officinalis*) 1:5 (экстрагент 70 % об/об этанол). Вспомогательное вещество: глицерин 85 %.

КОД КЛАССИФИКАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Фармакотерапевтическая группа по АТС:

R02AA20 – Средства для лечения заболеваний гортани и глотки. Антисептические средства.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Лекарственное средство Миррамил оказывает местное противовоспалительное, антисептическое и репаративное действие.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Местное симптоматическое лечение воспалительных заболеваний полости рта и глотки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Орошать слизистую оболочку полости рта, глотки и зева 4 - 6 раз в день, впрыскивая две дозы, распыляемые двумя нажатиями головки распылителя. В момент впрыскивания рекомендуется задержать дыхание.

Перед употреблением взболтать.


Длительность курса лечения определяется врачом с учётом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

Применение у детей

Лекарственное средство противопоказано для применения у детей до 18 лет в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности. При применении спрея у детей младшего возраста может развиваться рефлекторный ларингоспазм.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможны аллергические и анафилактические реакции. Цветки ромашки аптечной могут вызывать реакции гиперчувствительности (контактный дерматит). В очень редких случаях



случаях могут развиваться серьезные аллергические реакции (анафилактический шок, бронхоспазм, отек Квинке, крапивница).

В связи с содержанием этилового спирта после применения спрея возможно появление кратковременной боли или раздражения слизистой полости рта.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как ~~арника, амброзия, пижма~~, ~~полынь, астра, хризантема~~. Период беременности и лактации. ~~Детский возраст до 18 лет.~~

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Случаи передозировки не известны.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания лекарственного средства в глаза.

Лекарственное средство содержит этиловый спирт 45 % (об/об). При впрыскивании двух доз в полость рта попадает 61,5 мг этанола (эквивалентно 1,2 мл пива и 0,65 мл вина).

В связи с содержанием настойки шалфея не рекомендовано непрерывное применение лекарственного средства более одной недели.

С осторожностью применять пациентам, склонным к аллергическим реакциям, и пациентам с бронхиальной астмой.

С осторожностью следует применять при заболеваниях печени, алкоголизме, эпилепсии, черепно-мозговой травме и других заболеваниях головного мозга со снижением судорожного порога.

После применения лекарственного средства рекомендуется в течение 30 минут воздерживаться от приема пищи и питья.

Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, развиваются нарушения дыхания, появляется кашель с гнойной мокротой), необходимо обратиться к врачу.

Применение в период беременности и кормления грудью

Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта применять во время беременности и лактации не рекомендуется.

Влияние на способность водить и управлять механизмами

Лекарственное средство содержит этиловый спирт! В период лечения следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и выполнении работы, которая требует повышенного внимания, быстрых психических и двигательных реакций.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных средств, содержащих этиловый спирт.

Взаимодействия, связанные с наличием в составе этилового спирта:

- лекарственные средства, вызывающие дисульфирамоподобную реакцию (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия) при совместном приеме с алкоголем: дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксеф, хлорамфеникол, хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид и другие гипогликемизирующие



препараты, гризефульвин, метронидазол, орнидазол, тинидазол, кетоконазол, прокарбазин.

- лекарственные средства, угнетающие функции центральной нервной системы.

Препараты листьев шалфея могут оказывать влияние на действие лекарственных средств, воздействующих на рецепторы ГАМК (напр., барбитуратов, бензодиазепинов), поэтому не рекомендуется эти лекарственные средства принимать совместно.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ХРАНЕНИЯ

2 года. Не использовать после срока годности, указанного на упаковке.



УСЛОВИЯ ОТПУСКА

Без рецепта врача.

УПАКОВКА

Флакон из темного стекла, в котором содержится 50 мл препарата, закручиваемый крышкой с дозатором и прилагаемым распылителем с наконечником вместе с инструкцией по применению в картонной коробке.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ЛЕКАРСТВОМ

В случае применения лекарства из новой упаковки, следует снять защитный колпачок, надеть головку распылителя с наконечником и несколько раз нажать на головку распылителя. Остерегаться попадания препарата в глаза.

После использования препарата снимать головку распылителя с наконечником не рекомендуется по следующим причинам:

- снять головку распылителя с наконечником достаточно трудно (что предостерегает от нечаянного просачивания лекарства);
- контакт лекарства с влажной поверхностью не желателен - достаточно орошать наконечник горячей водой снаружи или протереть спиртом (наконечник промывать изнутри нет необходимости).
- препарат рекомендуется хранить в защищенном от света месте.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЗАО «Валентис», шс. Молету 11, 08409 Вильнюс, Литва,
тел. +37052701225, факс +370 5 2701223

ВЛАДЕЛЕЦ ЛИЦЕНЗИИ

ЗАО «Валентис», шс. Молету 11, 08409 Вильнюс, Литва,
тел. +370 5 2701225, факс +370 5 2701223

Kvalifikuotas asmuo
farmakologiniam budrumui
Crepta Astrauskaitė

