

## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

**HALSET®  
ХАЛЬСЕТ®**

*Cetylpyridinium chloride*  
Таблетки для рассасывания

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
от «21» 12 2020 г. № 1366  
УЛС № 9 от «15» 12 2020

**Общая характеристика**

Таблетки прямоугольные, плоские с двух сторон, с гладкой поверхностью, округлые по углам и краям, белого цвета с блеском, со сладким мятным вкусом.

**Состав**

Одна таблетка содержит: действующее вещество: 1,5 мг цетилпиридиния хлорида, вспомогательные вещества: сорбитол, мятное масло, ментол, магния стеарат.

**Фармакотерапевтическая группа**

Препараты для лечения заболеваний горла. Антисептики.

**Свойства и особенности действия**

Хальсет® проявляет бактерицидные свойства по отношению к грамположительным и грамотрицательным бактериям. Обладает противогрибковыми свойствами при воспалениях слизистой оболочки ротовой полости и горла. Хальсет® не содержит сахара. Лекарство хорошо переносится организмом.

**Показания к применению**

Для местного лечения в составе комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки (стоматит, гингивит, тонзиллит, фарингит).

**Противопоказания**

Гиперчувствительность к цетилпиридинию хлориду или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе «Состав».

Бронхиальная астма и другие респираторные состояния, связанные с тяжёлой гиперчувствительностью дыхательных путей.

Судороги (в том числе фебрильные) у детей в анамнезе.

Не применять в области открытых ран полости рта.

Детский возраст до 6 лет.

Непереносимость фруктозы, которая может образовываться из сорбита (редко проявляющаяся метаболическая болезнь).

**Предостережения при применении**

Вне зависимости от приема препарата Хальсет®, при тяжелых воспалительных процессах верхних дыхательных путей или болях в горле, протекающих с высокой температурой, головной болью, тошнотой и рвотой, необходимо проконсультироваться с врачом, особенно если клиническая картина заболевания нарастает или не уменьшается в течение трёх дней.

Не следует принимать при наличии открытых ран в полости рта, т.к. цетилпиридиния хлорид замедляет их заживление.

В связи с наличием в составе препарата мятного масла, с осторожностью использовать у лиц с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, нарушения функции печени.

С осторожностью женщинам, планирующим беременность, при беременности и в период лактации.

Применение большего количества таблеток, чем рекомендуется, не увеличивает эффективность действия лекарственного средства, в тоже время может вызвать раздражение слизистой оболочки ротовой полости или диарею (особенно у детей), тошноту и рвоту.

Принимая во внимание отсутствие сахара, Хальсет<sup>®</sup> может применяться лицами с не осложненным сахарным диабетом.

Лекарство Хальсет<sup>®</sup> содержит сорбитол, поэтому его не стоит применять пациентам, у которых выявлена непереносимость фруктозы.

В случае появления аллергической реакции пациент должен обратиться к врачу.

#### *Лекарственное взаимодействие и другие виды взаимодействий*

Неизвестны взаимодействия цетилпиридиния хлорида, применяемого в форме таблеток для рассасывания с концентрацией действующего вещества 0,2%. Хальсет<sup>®</sup> наиболее эффективно действует в слабо щелочной среде; в сильно кислой среде - инактивируется.

Пища и молоко снижают антисептический и местно анестезирующий эффекты.

#### *Беременность и лактация*

Многолетний опыт использования цетилпиридиния хлорида не выявил неблагоприятных последствий, однако контролируемые исследования по применению препарата Хальсет<sup>®</sup> в период беременности и кормления грудью отсутствуют. Использовать лекарственное средство у данной категории пациентов следует с осторожностью, под медицинским наблюдением.

#### *Влияние на способность к возждению автотранспорта и управлению движущимися механизмами*

Препарат не ограничивает способности к управлению транспортными средствами и обслуживанию движущихся механизмов.

#### *Информация о вспомогательных веществах*

Препарат содержит сорбитол. Если у пациентов ранее наблюдалась непереносимость сахаров, необходимо проконсультироваться с врачом.

#### *Режим дозирования и способ применения*

##### *Режим дозирования*

Дети от 6 до 12 лет: до 4 таблеток в день.

Следует рассасывать по одной таблетке каждые 4 часа.


Дети старше 12 лет и взрослые: до 8 таблеток в день.

Следует рассасывать по одной таблетке каждые 2 часа.

Не следует принимать таблетки непосредственно перед едой или во время приёма пищи.

#### *Пациенты с нарушением функции почек*

Нет данных о необходимости коррекции дозы.



НД РБ

5126 - 2020

*Пациенты с нарушением функции печени*

Следует принимать с осторожностью (смотрите раздел «Предостережения при применении»).

*Пациенты пожилого возраста*

Нет данных о необходимости коррекции дозы.

**Передозировка**

Сorbitол, количественно являющийся основным компонентом таблеток, при значительной передозировке может вызвать диарею с сопутствующим обезвоживанием. Передозировка Цетилпиридиния хлорида может привести к раздражению слизистой оболочки ротовой полости, диареи (особенно у детей), тошноте и рвоте. В случае подозрения на передозировку лекарственного средства пациент должен немедленно обратиться к врачу за консультацией.

Мероприятия, которые следует применять в случае отравления: промывание желудка, поддержка деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой систем. При появлении судорог необходимо назначить барбитураты в малых дозах.

***В случае если пропущен очередной прием***

Лечение надо продолжать, придерживаясь дозирования препарата Хальсет® в соответствии с листком-вкладышем.

*Не надо применять двукратной дозы с целью дополнения пропущенной дозы.*

**Побочное действие**

Редко могут наступить быстро преходящие аллергические реакции (например: кожная сыпь), тошнота и расстройство вкуса, возможно возникновение диареи.

**Условия и срок хранения**

Не применять препарат по истечении его срока годности. Препарат хранить в недоступном для детей месте. Хранить в сухом месте, при температуре ниже 25°C. Три года от даты производства.

**Условия отпуска**

Препарат отпускают без рецепта.

**Упаковка**

Препарат упаковывают по 6 таблеток в блистере, по 4 блистера в картонной коробке.

**Информация о производителе**

BIOFARM®ООО, 60-198 Познань, ул. Валбжиска 13, Польша, тел. +48 61 66 51 500  
(по лицензии Gebro GmbH, Австрия).

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь